©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Abteilung für Zoologie u. Botanik am Landesmuseum „Joanneum“
Heft 6 Graz 1956

In Graz gepflanzte Laubhölzer

Von
FRANZ HANSELMAYER
GRAZ

Schriftleitung: Dr. Karl Mecenovic

Im Selbstverlag der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum „Joanneum“
Graz, Raubergasse 10.
Ausgegeben im Dezember 1956

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Druck Leykam A. G., Graz

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

In Graz gepflanzte Laubhölzer

Von FRANZ HANSELMAYER, Graz

In den Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark, Bd. 75 (1939), Seite 17 bis 30, ist eine Aufzählung der „In Graz und Umgebung gepflanzten Nadelhölzer" von J. EGGLER enthalten und vermerkt, daß die Laubhölzer einer späteren Veröffentlichung vorbehalten sind. Durch Doktor W. KRIECHBAUM angeregt, für Gärtner und Gartenfreunde auch die in Graz und Umgebung gepflanzten Laubhölzer zu veröffentlichen, hat mir Dozent Dr. J. EGGLER seine gemeinsam mit den Nadelhölzern seinerzeit gesammelten Belege der Laubhölzer in drei Herbarfaszikeln mit dem Wunsch übergeben, sie zu bearbeiten, zu ergänzen und zu veröffentlichen, weil er hiefür vorderhand nicht die nötige Zeit aufbringt. Diesem Wunsch bin ich gern nachgekommen, mußte aber bald erkennen, daß eine vollständige Erfassung der gepflanzten Laubhölzer dem Einzelnen kaum möglich ist und etlicher Jahre bedarf. Ich habe mich aber trotzdem zur Veröffentlichung des Ergebnisses entschlossen und dabei vor allem getrachtet, möglichst alle Gattungen, von denen Arten in Graz und Umgebung gedeihen, ausfindig zu machen. Ich hoffe, diese Liste durch weitere Begehungen und durch die Unterstützung aller Gehölzfreunde möglichst zu vervollständigen. Das Grazer Klima (siehe Seite 4) ist so günstig, daß manche Arten, für die in den Gartenbüchern guter Winterschutz gefordert wird, bei uns ohne solchen aushalten. Als Beispiel führe ich die *Escallonien* an, die in den Baumschulen kaum geführt werden, weil sie als nicht winterhart gelten. Bei mir gedeihen sie seit Jahren (1936 bis 1955) ohne jeden Winterschutz im Garten, ohne daß sie jemals abgefroren wären.

Selbstverständlich sind auch in Graz nicht alle Lagen gleichwertig. So ist die Kultur vieler Pflanzen auf den südseitigen und geschützten Hanglagen günstiger als auf den nordseitigen und in ebenen Lagen.

Ich wäre allen Lesern sehr dankbar, wenn sie mir in dieser Liste nicht angeführte Fundorte an meine Anschrift, die am Schluß dieses Artikels steht, bekanntgeben wollten; denn es war mir nicht möglich, alle Privatgärten zu besuchen; auch kann mir in größeren Anlagen leicht die eine oder andere Art entgangen sein.

Ich habe mich bemüht, die jetzt gültigen Pflanzennamen ausfindig zu machen, was bei der noch nicht zur Ruhe gekommenen wissenschaftlichen Nomenklatur oft nicht leicht war. Daher habe ich mich vor allem in der wissenschaftlichen Benennung der Arten an die umfassendste neuere Dendrologie von REHDER, Manual of Cultivated Trees and Shrubs, New York 1954, gehalten. Die nach Gattungen oder Personen benannten Arten habe ich nach den Empfehlungen des Internationalen Botaniker-Kongresses in Stockholm (1950) klein geschrieben. Synonyme wurden nur insoweit angeführt, als sie heute noch verwendet werden. Zum leichteren Auffinden sind die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge angeordnet.

Allen jenen, die mir Fundorte angegeben oder mich sonst unterstützt haben, möchte ich an dieser Stelle danken, so den Besitzern der Baumschulen, ferner besonders Herrn H. BRUNNER, Frau Dozent Dr. A. BUSCHMANN, Herrn Dozent Dr. J. EGGLER und Herrn Dr. W. KRIECHBAUM; nicht zuletzt der Steiermärkischen Landesregierung und dem Bürgermeister der Stadt Graz, Herrn Dr. J. SPECK, die mir die Begehung der in ihrer Obhut befindlichen Anlagen gestatteten.

Herrn Univ.-Prof. Dr. F. WIDDER danke ich für die Erlaubnis zur Benützung der Bibliothek des Institutes für systematische Botanik der Universität Graz.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Meteorologische Angaben zum Klima von Graz:

	Jahresmittel			Schwankungen	
		Temperaturen in C°	Niederschläge in mm	Temperaturen	Niederschläge
Normalperiode	1901—1930	8,9°	891,9	8,1°—9,7°	608,9—1133,6
50-jähriges Mittel	1901—1950	9,0°			
	1881—1930	8,8°	874,0		
	1948—1954	9,45°	762,5	9,1°—9,8°	681—844

	Extreme	
	Temperaturen	Niederschläge
1901—1930	+ 32,5° bis —23,7°	608,9—1133,6

Die Vegetationszeit — das ist die Zeit zwischen Vorfrühlingsbeginn (Schneeglöckchenblüte) bis zum Absinken des Tagesmittels unter +5° C — dauert für das Gebiet von Graz bis 235 Tage.

In vorliegender Arbeit benützte Literatur sowie wichtigste Bestimmungs- und Nachschlagsbehelfe für Laubhölzer:

Fitschen J. 1950. Gehölzflora. 4. Aufl. Heidelberg.

Fritsch K. 1909. Exkursionsflora für Österreich. 2. Aufl. Wien.

Hamburger J. 1948. Zur Adventivflora von Graz (unveröffentlichte Dissertation).

Hauszer K. 1935. Gärtnerisch-botanischer Führer über den Grazer Schloßberg. Graz.

Hoffer M. u. Lämmermayr L. 1922. Junk's Naturführer: Steiermark. Berlin (Stadtpark, p. 200 ff.).

Krüssmann G. 1951. Die Laubgehölze. 2. Aufl. Berlin.

Lämmermayr L. 1926. Die Pflanzendecke der Steiermark. In: Heimatkunde der Steiermark XIV. Ein Gang durch die Parkanlagen von Graz (Stadtpark, Schloßberg). Wien, Leipzig, Prag.

Lämmermayr L. 1933. Querschnitte durch den Boden, die Pflanzendecke und Tierwelt von Graz. In: Naturgeschichtliche Lehrwanderungen in der Heimat. Heft I. Graz.

Rehder A. 1954. Manual of Cultivated Trees and Shrubs. 2. Aufl. New York.

Rosenkranz F. 1951. Grundzüge der Phänologie. Wien.

Schneider C. 1906—1912. Illustriertes Handbuch der Laubholzkunde, 1, 2. Jena.

Silva Tarouca E. u. Schneider C. 1930. Unsere Freiland-Laubgehölze. 3. Aufl. Wien.

Wocke E. 1922. Gehölzbuch für Gartenfreunde und Gärtner. 2. Aufl. Frankfurt a. O.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Im Texte verwendete Abkürzungen:

H = Heimat bzw. natürliches Vorkommen.
F = Fundort im Untersuchungsgebiet.
f. = forma.
Bot.G. = Botanischer Garten der Universität Graz.
Bsch. = Baumschule.
u. a. = und anderwärts.
p. pte. = zum Teil.
fl. pl. = mit gefüllten Blüten.

Verzeichnis der Laubholzgattungen und -arten

Acanthopanax Dcne. et Planch., Stachelkraftwurz — *Araliaceae.*

— **henryi Harms.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.

— **sieboldianus Mak.** *(=A. spinosus, =Aralia pentaphylla)*, **H:** Japan, **F:** Bsch. Klenert.

Acer L., Ahorn — *Aceraceae.*

— **campestre L.**, Feld-Ahorn, Maßholder, **H:** Europa, Westasien, **F:** Vor dem Bad Friedrichgasse (Naturschutz!), Bsch. Grubbauer. — Auch sonst nicht selten.

— **carpinifolium S. et Z.**, Hainbuchen-Ahorn, **H:** Japan, **F:** Schloßberg beim Türkenbrunnen.

— **ginnala Maxim.**, Mandschurischer Ahorn, **H:** Mittel- und Nordchina, Mandschurei, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **japonicum Thunb.**, Japanischer Ahorn, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Babenbergerstraße, Bsch. Kern.

— **monspessulanum L.**, Französischer Ahorn, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Schloßberg: Mauerbrüstung beim Uhrturm.

— **negundo L.** *(=Negundo fraxinifolium, =N. aceroides)*, Eschen-Ahorn, **H:** Östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Nähe der Trauerweide, Bsch. Grubbauer, Ecker und Thalhammer u. a. — Zahlreiche Gartenformen mit weißbunten, weißrandigen, gelben und gekräuselten Blättern:

— — **auratum Schwer.** *(=A. californicum aureum, =A. negundo odessanum)*, **F:** Burg, Parkring, Stadtgärtnerei.

— **palmatum Thunb.**, Fächer-Ahorn, **H:** Japan, **F:** Stadtpark: Nähe des Anastasius-Grün-Denkmals, Schloßbergplateau, Murkai, Bsch. Grubbauer. — Viele Formen:

— — **atropurpureum Schwer.**, Rotblättriger Fächer-Ahorn, **F:** Bsch. Kern und Ecker.

— — **dissectum Maxim.**, **F:** Bsch. Kern.

— **pennsylvanicum L.**, Schlangenhaut-Ahorn, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

— **platanoides L.**, Spitz-Ahorn, **H:** Europa, Kaukasus. — Zahlreiche Formen:

— — **globosum Nichols.**, mit kugeliger Krone, **F:** Stadtgärtnerei.

— — **schwedleri Nichols.**, meist als Blut-Ahorn bezeichnet, doch haben auch andere Arten mehr oder minder rötliche Blätter (besonders im Austrieb), **F:** Stadtpark mehrere, z. B. Nähe der Franck-Eiche, Kinderspielplatz, Stadtgärtnerei, Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer u. a.

— **pseudoplatanus L.**, Berg-Ahorn, **H:** Europa, Westasien. Von den Formen seien genannt:

— — **leopoldii Schwer.**, weiß und rosa gescheckte Blätter, **F:** Stadtpark beim Brunnen, Bsch. Grubbauer.

— — **handjeryi Schwer.** *(=A. pseudoplatanus Prinz Handjery, =A. pseudoplatanus brillantissimus)*, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **rubrum drummondii Sarg.** *(=A. Drummondii)*, **H:** südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Klenert.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **saccharum Marsh.**, Zucker-Ahorn (=*A. saccharinum Wangh.* nicht L., =*A. barbatum*), **H:** nördliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **saccharinum laciniatum Carr.**, Silber-Ahorn (=*A. dasycarpum wieri*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Stadtpark beim Roseggerdenkmal, Bsch. Grubbauer.
— **tartaricum L.**, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Garten der Maschinenfabrik Andritz.

Actinidia Lindl., Strahlengriffel — *Dilleniaceae.*
— **arguta Miq.**, Scharfzähniger Strahlengriffel, **H:** Japan, Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
— **chinensis Planch.**, Chinesischer Strahlengriffel, **H:** China, **F:** Bot. G.
— **kolomikta Maxim.**, Mandschurischer Strahlengriffel, **H:** Nordostasien, China, Japan, **F:** Bot. G.

Aesculus L., Roßkastanie — *Hippocastanaceae.*
— **carnea Hayne**, Rote Roßkastanie (=*A. rubicunda*, =*A. hippocastanum* x *pavia*), mit mehreren Formen, häufig, z. B. Stadtpark, Schloßberg, Anfang Bergstraße Eggenberg.
— **hippocastanum L.**, Gemeine Roßkastanie, **H:** Nordgriechenland, Bulgarien, **F:** Häufig gepflanzter Alleebaum mit vielen Gartenformen.
— **octandra Marsh.**, Gelbe Roßkastanie (=*A. flava*, =*A. lutea*, =*Pavia lutea*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Nähe des Franckdenkmals.
— **parviflora Walt.**, Langtraubige Roßkastanie (=*A. macrostachya*), **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Hauptallee.
— **pavia L.**, Rotblühende Roßkastanie (=*Pavia rubra*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark (Kleinbaum bis 6 m).

Ailantus* Desf., Götterbaum — *Simarubaceae.*
— **altissima Swingle**, Götterbaum (=*A. glandulosa*), **H:** China, **F:** Stadtpark: besonders glacisseitig; oft gepflanzt und hie und da verwildert (z. B. Plabutsch).
— **vilmoriniana Dode** (=*A. glandulosa* var. *spinosa*), **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

Akebia Dcne., Akebie — *Lardizabalaceae.*
— **lobata Dcne.** (=*A. trifoliata*), **H:** Mittelchina bis Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **quinata Dcne.**, **H:** Mittelchina bis Korea, Japan, **F:** Bot. G., Rudolfstraße 12, Bsch. Klenert, Grubbauer und Kern.

Amelanchier Med., Felsenbirne — Rosaceae.
— **ovalis Med.**, Gemeine Felsenbirne (=*A. vulgaris*, =*A. rotundifolia*), **H:** Süd- und Mitteleuropa, **F:** Bot. G., in der Nähe des „Klettergartens" St. Veit, Jungfernsprung.
— **spicata K. Koch**, Ährige Felsenbirne, **H:** nordöstliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Amorpha L., Bastard-Indigo, Unform — *Leguminosae.*
— **fruticosa L.**, Gemeiner Bastard-Indigo, **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G., Steinbergstraße, Bsch. Ecker und Grubbauer.

Ampelopsis Mchx., Doldenrebe, Scheinrebe — *Vitaceae.*
— **brevipedunculata Koehne**, Rauhhaarige Doldenrebe, **H:** Nordostasien, **F:** Schloßberg: Tor zum Herbersteingarten.
— — **maximowiczii f. elegans** (=*A. tricolor*, =*Vitis heterophylla variegata*), Blätter weiß und rosa gescheckt, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **megalophylla Diels et Gilg.** (=*Vitis megalophylla*), **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Mauern des Kriegerdenkmals, Bsch. Grubbauer.

Aralia L., Aralie — *Araliaceae.*
— **elata Seem.** (=*A. chinensis*), **H:** Japan, Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.

---

* Richtiger ohne „h"; kommt vom molukkanischen „ailanto".

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **spinosa L.**, Teufelsspazierstock, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg, Jubiläumssteig links (in der Nähe einer Eibe), Bsch. Grubbauer.

Aristolochia L., Osterluzei, Pfeifenwinde — *Aristolochiaceae.*

— **durior Hill.** (=*A. sipho*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Hof der Grieskaischule, Humboldtstraße, Bsch. Grubbauer und Thalhammer.

Aronia Med., Apfelbeere — *Rosaceae.*

— **arbutifolia Elliot.**, Rotfrüchtige Apfelbeere (=*Sorbus arbutifolia*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.

Aucuba Thunb., Goldblatt — Cornaceae.

— **japonica variegata D'Ombr.** (=*A. maculata*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Am Grabenwald (Eggenberg) u. a., Bsch. Klenert. Wird meist als Kalthauspflanze kultiviert, ist aber bei uns winterhart.

Baccharis L., Kreuzstrauch — *Compositae.*

— **halimifolia L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei.

Berberis L., Berberitze, Sauerdorn — *Berberidaceae.*

— **buxifolia Poir.**, Buchsbaum-Berberitze (=*B. dulcis*), **H:** südliches Südamerika, **F:** Bsch. Klenert, Thalhammer (*var. nana*).

— **candidula C. Schn.** (=*B. hookeri var. candidula*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Ecker.

— **gagnepainii C. Schn.** (=*B. acuminata* p. pte), **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Jubiläumssteig unter Eibe, Landeskrankenhaus, Am Grabenwald, Bsch. Kern.

— **polyantha Hemsl.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.

— **sanguinea Franch.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **thunbergii DC.** (=*B. japonica*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.

— — **atropurpurea Chenault**, Japanische Blutberberitze, **F:** Bot. G., Stadtpark, Opernhaus, Herbersteingarten, Anlage Murkai, Körösistraße, Hirtenschule (Hecke), Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.

— **veitchii C. Schn.** (=*B. acuminata*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **verruculosa Hemsl. et Wils.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **vulgaris atropurpurea Reg.**, **F:** Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— **wilsoniae Hemsl. et Wils.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Jubiläumssteig, Bsch. Ecker und Grubbauer.

Da *Berberis*-Arten schwer unterscheidbare Bastarde liefern, sind reine Arten selten. So sollen die Arten im Botanischen Garten vorwiegend Bastarde sein.

Betula L., Birke — *Betulaceae.*

— **excelsa Aiton**, Hohe Birke, hübscher Bastard zwischen *B. papyrifera* und *B. pumila*, **F:** Bot. G.

— **humilis Schrank**, Strauch-Birke, **H:** Europa, Nordasien bis Altai, **F:** Bsch. Thalhammer.

— **lenta L.**, Zucker-Birke, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Klenert.

— **papyrifera Marsh.**, Papier-Birke, **H:** nördliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.

— **pendula Roth**, Gemeine Weißbirke (=*B. verrucosa*, =*B. alba* p. pte), **H:** Europa, Kleinasien bis Mandschurei, **F:** Stadtpark, Landeskrankenhaus, Jungferngasse auf Torbogen, Liebiggasse u. a., Bsch. Kern und Thalhammer.

— — **dalecarlica C. Schn.** Schlitzblättrige Birke (=*B. laciniata*), **F:** Straße zur Hubertushöhe.

— — **fastigiata K. Koch** (=*B. pendula pyramidalis*), **F:** Bot. G., Mariagrünerstraße (Besitz Rumpf).

— — **youngii C. Schn.**, Hänge-Birke, **F:** Bsch. Grubbauer.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Broussonetia Vent., Papier-Maulbeerbaum — *Moraceae.*
— **papyrifera Vent.**, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G.

Buddlea* L., Sommer- oder Herbstflieder — *Loganiaceae.*
— **alternifolia Maxim.**, **H:** Nordwestchina, **F:** Bot. G.
— **davidii Franch.** *(=B. variabilis)*, **H:** China, **F:** Bot. G., Schloßberg: Jubiläumssteig, Aufgang Karmeliterplatz, vor dem Eingang zum Rosenhain, Stadtgärtnerei, Am Grabenwald, Mälzerweg, Heimgartenstraße, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.
— **japonica Hemsl.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G.

Buxus L., Buchsbaum — *Buxaceae.*
— **microphylla japonica Rehd. et Wils.** *(=B. japonica, =B. sempervirens japonica)*, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **sempervirens L.**, Gemeiner Buchsbaum, **H:** Südeuropa, Westasien, Nordafrika, **F:** Bot. G., Stadtpark, Bsch. Grubbauer. — Viele grüne und buntblättrige Formen. Bei uns fast nur als niederer Busch oder Hecke (z. B. Bergstraße) häufig.
— — **arborescens L.**, verträgt jeden Schnitt, so daß wir ihn buschig, als Pyramide oder Säule, in Kugelform usw. in Gärten und Anlagen finden. **F:** Bot. G., Stadtpark, Liebiggasse, Bsch. Grubbauer.
— — **argenteo-variegata West.** *(=B. sempervirens* var. *argentea)*, mit weißbunten Blättern, **F:** Bsch. Grubbauer und Klenert.
— — **aureo-variegata West.**, mit gelbbunten Blättern, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **handsworthii Dallimore**, **F:** Bsch. Grubbauer und Klenert.
— — **suffruticosa L.**, Zwergform, der „Einfassungsbuchs", **F:** in vielen Gärten (z. B. Hecke in der Bayernstraße), auf Friedhöfen, Bsch. Grubbauer.

Callicarpa L., Schönfrucht — *Verbenaceae.*
— **dichotoma K. Koch.** *(=C. koreana)*, **H:** Ost- und Mittelchina, Korea, **F:** Bot. G.
— **japonica Thunb. H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **leucocarpa Sieb.**, weißfrüchtig, **F:** Bot. G.

Calluna Salisb., Besenheide, Heidekraut — *Ericaceae.*
— **vulgaris Hull. H:** Europa, Kleinasien. — Viele Kulturformen, **F:** Bsch. Kern.

Calophaca Fisch., Schönhülse — *Leguminosae.*
— **wolgarica Fisch.**, **H:** südliches Rußland bis Turkestan, **F:** Bsch. Grubbauer.

Calycanthus L., Gewürzstrauch — *Calycanthaceae.*
— **floridus L.**, Erdbeer-Gewürzstrauch, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Grubbauer.
— **occidentalis Hook. et Arn.**, Großblättriger Gewürzstrauch, **H:** Kalifornien, **F:** Bot. G.

Campsis Lour. *(=Tecoma Juss.)*, Trompetenblume, Jasmintrompete — *Bignoniaceae.*
— **grandiflora Schum.** *(=C. chinensis, =Tecoma chinensis)*, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G.
— **radicans Seem.** *(=Bignonia* oder *Tecoma radicans)*, **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G., äußerer Burghof, Körblergasse, Bsch. Kern, Grubbauer und Thalhammer.

Caragana Lam., Erbsenstrauch — *Leguminosae.*
— **arborescens Lam. H:** Sibirien, Mandschurei, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei u. a.
— — **pendula Carr.**, **F:** Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
— **boisii C. Schn.** *(=C. ambigua)*, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **fruticosa Bess.**, **H:** Amurgebiet, Korea, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **sinica Rehd.** *(=C. chamlagu)*, **H:** Nordchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

---

* Nach A. BUDDLE benannt, daher nicht *Buddleia* oder *Buddleya* (siehe auch BOERNER F., Taschenwörterbuch der botanischen Pflanzennamen, Berlin 1951 : 31).

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Carpinus L., Hain- oder Weißbuche — *Betulaceae.*

— **betulus L.**, Weißbuche, **H:** Europa bis Persien, **F:** wird, da sie starken Schnitt verträgt, häufig als Hecke verwendet: Opernring, hinter Kaiser-Josef-Denkmal, Georgigasse (Park), Grasbergerstraße, u. a., Bsch. Grubbauer und Kern. — Von Formen sei erwähnt:

— — **fastigiata Jaeg.**, Säulen-Hainbuche (=*C. betulus pyramidalis*, =*C. betulus columnaris*), **F:** Bsch. Thalhammer.

— **caroliniana Walt.** (=*C. americana*), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

Caryopteris Bge., Bartblume — *Verbenaceae.*

— **clandonensis Simmonds** (=*C. incana* × *mongolica*), **F:** Bsch. Grubbauer und Kern.

— **incana Miq.** (=*C. mastacanthus*), **H:** Japan bis Nordwestchina, **F:** Bsch. Kern.

Castanea Mill., Edelkastanie — *Fagaceae.*

— **sativa Mill.**, Edelkastanie (=*C. vesca*, =*C. vulgaris*), **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Schloßberg (Schweizerhaus), Körblergasse 100 (Naturschutz!), Lineckerweg 50 (Naturschutz!), angepflanzt und verwildert, z. B. Plabutsch, Rosenberg, Lineck u. a., Bsch. Grubbauer und Kern.

Catalpa Scop., Trompetenbaum — *Bignoniaceae.*

bignonioides Walt., Gemeiner Trompetenbaum, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Stadtpark, nächst Schillerdenkmal, Krausgasse, vor dem Hotel Daniel, Thalstraße (Gösting), Bsch. Grubbauer.

— **hybrida japonica Rehd.** (=*C. japonica;* vielleicht *C. ovata* x *bignonioides*), **F:** Bsch. Kern.

— **ovata Don.**, Japanischer Trompetenbaum (=*C. kaempferi*), **H:** China, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.

— **speciosa Warder**, Prächtiger Trompetenbaum, **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei.

Ceanothus L., Säckelblume — *Rhamnaceae.*

— **americanus L.**, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Klenert.

Celastrus L., Baumwürger — *Celastraceae.*

— **orbiculata Thunb.**, Rundblättriger Baumwürger (=*C. orbicularis*), **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer und Kern.

— **scandens L.**, Gemeiner Baumwürger, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Celtis L., Zürgelbaum — *Ulmaceae.*

— **australis L.**, Südlicher Zürgelbaum, **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: östlich des kleinen Rondells, Babenbergerstraße.

— **occidentalis L.**, Amerikanischer Zürgelbaum, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark.

Cercidiphyllum S. et Z., Judasbaumblatt, Scheinjudasblatt — *Cercidiphyllaceae.*

— **japonicum S. et Z.**, Kadsura-Baum, Japanisches Judasbaumblatt, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Stadtpark: Wiese gegenüber Musikpavillon, Bsch. Grubbauer.

Cercis L., Judasbaum — *Leguminosae.*

— **canadensis L.**, Kanadischer Judasbaum, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G.

— **chinensis Bge.**, Chinesischer Judasbaum (=*C. japonica*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.

— **siliquastrum L.**, Gemeiner Judasbaum, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark, Joanneumgarten.

Chaenomeles Lindl., Scheinquitte — *Rosaceae.*

— **japonica Lindl.**, Japanische Scheinquitte (=*Ch. maulei*, =*Cydonia*

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

maulei, =Cydonia japonica), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern, viele Gartenformen.

— **lagenaria Koidz.** *(=Cydonia japonica, =Cydonia lagenaria),* **H:** China, Japan, **F:** Bsch. Grubbauer. Auch hier viele Formen.
Chaenomeles unterscheidet sich von *Cydonia* durch dornige Zweige. Die verschiedenen Formen werden auch als Zierhecken gern verwendet, z. B. am Schloßberg: Herbersteingarten.

Chimonanthus Lindl., Winterblüte — *Calycanthaceae.*

— **praecox Link.** *(=Calycanthus praecox, Meratia praecox),* **H:** China, **F:** Bot. G. (dort auch *C. praecox grandiflorus).*

Chionanthus L., Schneeblume, Schneeflockenbaum — *Oleaceae.*

— **virginica L., H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark, Bsch. Grubbauer.

Cistus L., Cistrose — *Cistaceae.*

— **hirsutus Lam., H:** Südwesteuropa, **F:** Bsch. Kern.

Cladrastis Raf., Gelbholz — *Leguminosae.*

— **lutea K. Koch, H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegenüber Anastasius-Grün-Denkmal.

— **sinensis Hemsl., H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G.

Clematis L., Waldrebe — *Ranunculaceae.*

— **alpina Mill.,** Alpen-Waldrebe, **H:** Mittel- und Südeuropa bis Nordostasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **heracleifolia DC.** *(=C. tubulosa),* **H:** China, **F:** Bot. G.

— **jackmanii Th. Moore** *(=C. lanuginosa* x *viticella),* **F:** Bsch. Grubbauer, Kern und Thalhammer, Ecke Janzgasse und Eggenbergerallee; häufiger gepflanzte großblumige dunkelblaue Waldrebe.

— **montana rubens Kuntze, H:** Himalaja, Zentralchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Kriegerdenkmal, Weg zum Rosenhain, Jägerhaus unter dem Schöckelkreuz, Bsch. Grubbauer (dort auch *C. montana alba).*

— **paniculata Thunb.,** Rispige Waldrebe, **H:** Japan, **F:** Schloßberg: Kriegerdenkmal.

— **rehderana Craib.** *(=C. nutans),* **H:** Westchina, **F:** Bot. G.

— **serratifolia Rehd.** *(=C. koreana),* **H:** Korea, **F:** Bot. G.

— **tangutica Korsh., H:** Mongolei bis Nordwestchina, **F:** Am Grabenwald.

— **viticella L.,** Italienische Waldrebe, **H:** Südeuropa bis Westasien, **F:** Bot. G.

Clerodendron L., Losbaum — *Verbenaceae.*

— **foetidum Bge., H:** China, **F:** Bot. G.

— **trichotomum Thunb.** *(=C. serotinum),* **H:** Japan, Ostchina, **F:** Bot. G.

Colutea L., Blasenstrauch — *Leguminosae.*

— **arborescens L.,** Gemeiner Blasenstrauch, **H:** Südeuropa, Nordafrika, **F:** Bot. G., Schloßberg (Westhang), Buchkogel (Osthang), wie auch sonst in Graz nur verwildert, Bsch. Grubbauer.

— **cilicica Boiss., H:** Kleinasien, **F:** Bsch. Grubbauer und Ecker.

— **orientalis Mill., H:** Kaukasus bis Turkestan, **F:** Bot. G.

Comptonia L'Her., Farnmyrte — *Myricaceae.*

— **asplenifolia Fern.,** Farnmyrte — *(=C. peregrina, =Myrica asplenifolia* p.pte), **H:** Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

Cornus L., Hartriegel — *Cornaceae.*

— **alba L.,** Tatarischer Hartriegel *(=C. tatarica),* **H:** Nordasien, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Klenert und Thalhammer.

— — **spaethii Wittm., F:** Bsch. Grubbauer.

— **alternifolia L.,** Wechselblättriger Hartriegel, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **amomum Mill.**, Seidenhaariger Hartriegel, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **florida L.**, Blumen-Hartriegel, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Stadtgärtnerei (Geschenk aus Montclair), Stadtpark, Schloßberg, Hilmteich, Bsch. Grubbauer.
— **kousa Buerg.**, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G.
— **mas L.**, Kornelkirsche (=*C. mascula*), **H:** Mittel- und Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G. (und *C. mas macrocarpa*), Stadtpark, Johann-Fux-Gasse, Plabutsch u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
— **officinalis S. et Z.**, Japanische Kornelkirsche, **H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **racemosa Lam.**, Traubenblütiger Hartriegel (=*C. candidissima*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **sanguinea L.**, Roter Hartriegel, **H:** Europa; häufig als Deckstrauch angepflanzt; verbreitet, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **stolonifera Mchx.**, Weißer Hartriegel (=*C. alba Wangh.* nicht L.), **H:** östliches Nordamerika, **F:** Rosenberg, Lindweg 33, Eggenberg, Baiernhof (buntblättrig); Anlagen in Laßnitzhöhe.
— — **flaviramea Rehd.**, **F:** Bsch. Ecker und Thalhammer.

Coronilla L., Kronwicke — *Leguminosae.*
— **emerus L.**, **H:** Mittel- und Südeuropa, **F:** Schloßberg: Plateau.

Corylopsis S. et Z., Scheinhasel — *Hamamelidaceae.*
— **glabrescens Franch et Sav.**, Kahle Scheinhasel (=*C. gotoana*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **spicata S. et Z.**, Ährige Scheinhasel, **H:** Japan, **F:** Bot. G.

Corylus L., Haselstrauch — *Betulaceae.*
— **avellana L.**, Waldhasel, **H:** Europa; viele Kultur-Fruchtsorten in den Gärten, außerdem:
— — **heterophylla Loud.** (=*C. avellana* var. *laciniata*, =*C. avellana* var. *urticaefolia*), **F:** Stadtpark, Bsch. Grubbauer (und var. *pendula*, var. *contorta*, var. *aurea*, var. *fuscorubra*).
— **colurna L.**, Baumhasel, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegenüber Einmündung der Zinzendorfgasse, Burggarten, Bsch. Grubbauer.
— **maxima purpurea Rehd.**, echte Bluthasel (var. *atropurpurea*), **F:** Stadtpark, in Gärten und Anlagen, Bsch. Grubbauer. Auch *C. avellana fuscorubra Dipp.* (var. *purpurea*, var. *atropurpurea*) wird als Bluthasel bezeichnet. **F:** Bsch. Kern.
— **tibetica Batal.**, Tibethasel, **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.

Cotinus Scop., Perückenstrauch — *Anacardiaceae.*
— **coggygria Scop.**, Gemeiner Perückenstrauch (=*Rhus Cotinus*), **H:** Südeuropa bis Mittelchina, **F:** Bot. G., Rosenberg: Minoritenschlössel, Körblergasse gegen Geidorfplatz, Stadtpark, Gösting (Besitz Professor Dr. Laker), Bsch. Grubbauer und Ecker.
— — **rubrifolius Boom.**, **F:** Bsch. Grubbauer.

Cotoneaster Med., Zwergmispel, Steinquitte — *Rosaceae.*
— **acuminata Ldl.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
— **acutifolia Turcz.**, Spitzblättrige Zwergmispel (=*C. pekinensis*), **H:** Nordchina, **F:** Bot. G.
— **adpressa Bois.**, **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, Bsch. Kern.
— **bullata Bois.**, Runzelige Zwergmispel, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
— **dammeri C. Schn.** (=*C. humifusa*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Bsch. Ecker und Kern.
— **dielsiana Pritz.** (=*C. applanata*), **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Kern.
— **divaricata Rehd. et Wils.**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **foveolata Rehd. et Wils.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
— **francheti Bois.**, **H:** Westchina, **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, Bsch. Ecker.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **henryana Rehd. et Wils.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
— **horizontalis Dcne.**, Niedergestreckte Zwergmispel, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Am Grabenwald, Mälzerweg, Bsch. Grubbauer, Ecker, Kern und Thalhammer.
— **integerrima Med.**, Gemeine Zwergmispel (=*C. vulgaris*), **H:** Europa, Nordasien bis Altai, **F:** Burggarten.
— **lindleyi Steud.**, **H:** Nordwest-Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **melanocarpa Lodd.**, Schwarzfrüchtige Zwergmispel (=*C. nigra*, =*C. pentagyna*), **H:** Europa bis Mittel- und Nordostasien, **F:** Bot. G.
— **microphylla Ldl.**, Kleinblättrige Zwergmispel, **H:** Himalaja, **F:** Bsch. Ecker.
— **rotundifolia lanata C. Schn.** (=*C. prostrata* var. *buxifolia*), **F:** Herbersteingarten vor dem Durchgang, Bsch. Kern.
— **salicifolia floccosa Rehd. et Wils.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer und Kern.
— — **rugosa Rehd. et Wils.** (=*C. rugosa*), **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **simonsii Bak.**, **H:** Himalaja, **F:** Bsch. Ecker.

Crataegus L., Weißdorn — *Rosaceae.*
— **altaica Lge.** (=*C. songarica*, =*C. wattiana*), **H:** Nordchina bis Turkestan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **azarolus L.**, **H:** Südeuropa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bsch. Klenert.
— **calpodendron Med.**, Filziger Weißdorn (=*C. tomentosa Rehd.*), **H:** Vereinigte Staaten, **F:** beim Parkhotel.
— **crus-galli L.**, Hahnensporn-Weißdorn, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **lavallei Herincq.** (=*C. carrierei*, =*C. crus-galli* x *pubescens*), **F:** Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
— **macracantha Lodd.**, Langdorniger Weißdorn, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **monogyna Jacq.**, Eingriffeliger Weißdorn, **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Hecken: Bergstraße. — Verbreitet.
— **nigra W. et K.**, Schwarzfrüchtiger Weißdorn, **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G.
— **oxyacantha L.**, Zweigriffeliger Weißdorn, **H:** Europa, Nordafrika, **F:** Bsch. Grubbauer (und var. *alba plena*). — Verbreitet.
— — **paulii Rehd.**, Echter Rotdorn (=*C. monogyna* var. *rubro-plena*).
— — **rubra-plena Hort.**, Rotdorn; beide letztere Arten oft gemischt, **F:** Allee bei der „Thalia", Fröbelpark, Bsch. Grubbauer und Kern. — Häufig.
— **pentagyna W. et K.**, Fünfgriffeliger Weißdorn, **H:** Südosteuropa, Kaukasus, Persien, **F:** Lindweg 33.

Cydonia Mill., Quitte — *Rosaceae.*
— **oblonga Mill.**, Gemeine Quitte (=*C. vulgaris*), **H:** Mittelasien, **F:** Bot. G., Schloßberg. — Viele Gartenformen kultiviert.

Cytisus L., Geißklee — *Leguminosae.*
— **albus Hacq.**, Weißblühender Geißklee (=*C. leucanthus*), **H:** Ungarn, Siebenbürgen, Bulgarien, **F:** Bot. G.
— **elongatus W. et K.**, Langästiger Geißklee, **H:** Ungarn, Serbien, **F:** Bot. G.
— **praecox Bean**, Elfenbeinginster (=*C. multiflorus* x *purgans*), **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, Bot. G., Bsch. Kern.
— **purpureus Scop.**, Roter Geißklee, **H:** Tirol bis Norditalien, **F:** Bot. G., Mälzerweg.
— **scoparius Lk.**, Besenginster (=*Sarothamnus scoparius*), **H:** Mittel- und Südeuropa, **F:** Schloßberg: Aufgang vom Paulustor, Felsensteig links in der Schlucht, in St. Peter und Waltendorf (kieselhold!), bei Mariatrost, Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
— **scoparius fulgens**, **F:** Bot. G.
— **sessilifolius L.**, Italienischer Geißklee, **H:** Südeuropa, Nordafrika, **F:** Bot. G.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Daphne L., Seidelbast — *Thymelaeaceae.*
— **alpina L.**, Alpen-Seidelbast, **H:** Alpen, **F:** Bot. G.
— **arbuscula Čelak.**, **H:** Ungarn, **F:** Bot. G.
— **blagayana Frey**, Königsblume, **H:** Gebirge Südosteuropas, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Mälzerweg.
— **caucasica Pall.**, **H:** Kaukasus, **F:** Bot. G.
— **cneorum L.**, Rosmarin-Seidelbast, Flaumiges Steinröslein, **H:** Gebirge von Spanien bis westliches Rußland, **F:** Bot. G., Schloßbergplateau, Gärtnerei Penitz in Liebenau, Am Grabenwald.
— **mezereum L.**, Gemeiner Seidelbast, Kellerhals, **H:** Europa bis Kaukasus und Altai, **F:** Wälder der Umgebung Graz, z. B. Plabutsch, Rannach, Schöckel; Bot. G., Bsch. Ecker.

Decaisnea Hook. et Thoms., Decaisnea — *Lardizabalaceae.*
— **fargesii Franch.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert und Grubbauer.

Deutzia Thunb., Deutzie — *Saxifragaceae.*
— **gracilis S. et Z.**, Zierliche Deutzie, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
— **lemoinei Lemoine** (=*D. parviflora* x *gracilis*), **F:** Bsch. Grubbauer. — Eine Kulturform mit vielen Sorten, die ebenfalls wieder an vielen Bastarden beteiligt ist. *Lemoine* hat zahlreiche Hybriden gezüchtet, die er als *discolor*-Formen verbreitet hat. Es herrscht hier ein großes Durcheinander in der Namensgebung, dessen Entwirrung allein schon eine Arbeit für sich wäre. Ähnlich verhält es sich auch mit *Philadelphus.*
— **magnifica latiflora** (=*D. crenata latiflora*, =*D. scabra x vilmoriniae*), **F:** Bsch. Grubbauer.
— **parviflora Bge.**, **H:** Nordchina, Mandschurei, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **scabra Thunb.** (=*D. crenata S. et Z.*), **H:** Japan, China, **F:** Bot. G., Stadtpark, Bergstraße, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer. — Häufig.
— **vilmoriniae Lemoine**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

Diervilla Adans., Buschgeißblatt, Weigelie, Diervillie — *Caprifoliaceae.*
— **rivularis Gatt.**, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer. — Mit „Diervilla" bezeichnet man heute meist nur die gelb-blühenden Arten, während die andersfarbigen großblumigen Züchtungen als „Weigelia" gehen.

Diospyros L., Dattelpflaume — *Ebenaceae.*
— **kaki L.**, Kakipflaume, **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Klenert.
— **virginiana L.**, Persimone, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Dryas L., Silberwurz — *Rosaceae.*
— **drummondii Rich.**, **H:** arktisches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **octopetala L.**, **H:** Europa, Asien, Nordamerika, **F:** Bot. G. u. a.
— **suendermannii Kellerer** (=*D. octopetala* x *drummondii*), **F:** Bot. G.

Elaeagnus L., Ölweide — *Elaeagnaceae.*
— **angustifolia L.**, Schmalblättrige Ölweide, **H:** Mediterrangebiet bis Mittelasien, Altai und Himalaja, **F:** Bot. G., Schloßbergplateau, Kehlberg, Göstingerstraße u. a., Bsch. Kern.
— **commutata Bernh.**, Silberbeere, Silber-Ölweide (=*E. argentea Pursh.*), **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Kern, Klenert und Thalhammer.
— **multiflora Thunb.**, Reichblütige Ölweide (=*E. edulis*), **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Ecker und Klenert.

Elsholtzia Willd., Elsholtzie — *Labiatae.*
— **stauntonii Benth.**, **H:** Nordchina, **F:** Bot. G.

Enkianthus Lour., Prachtglocke — *Ericaceae.*
— **campanulatus Nichols.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Escallonia Mutis, Escallonie — *Saxifragaceae.*
— **hybrida, Donard Seedling** *(=E. langleyensis* x *virgata),* die Heimat der *Escallonien* ist Südamerika, u. zw. kommen die meisten in den Anden vor, **F:** Am Grabenwald.

Eucommia Oliv. — *Eucommiaceae.*
— **ulmoides Oliv.,** **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.

Euonymus L., Spindelbaum — *Celastraceae.*
— **alata Reg.,** Geflügelter Spindelbaum, **H:** Japan, Mandschurei, Korea, China, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **fortunei carrierei Rehd.,** *(=E. radicans carrierei),* **F:** Bsch. Grubbauer.
— **latifolia Scop.,** Breitblättriger Spindelbaum, **H:** Südeuropa bis Westasien, **F:** Bot. G.
— **nana Bieb.,** Zwerg-Spindelbaum, **H:** Kaukasus bis Westchina, **F:** Bot. G. (dort auch *E. nana* var. *rosmarinifolia).*
— **radicans gracilis Rehd.** *(=E. radicans argenteo-marginata),* alle weiß- oder gelblichbunten Formen, **F:** Bot. G., Bsch. Kern und Ecker.
— **sachalinensis Maxim.,** Flachstieliger Spindelbaum *(=E. planipes),* **H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.

Evodia Forst., Evodie — *Rutaceae.*
— **daniellii Hemsl.,** **H:** Nordchina, Korea, **F:** Bot. G.

Exochorda Ldl., Prunkspiere — *Rosaceae.*
— **edgeworthii ? H: ? F:** Bot. G.
— **giraldii Hesse, H:** Nordwestchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **korolkowii Lav., H:** Turkestan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **macrantha C. Schn.** *(=E. racemosa* x *korolkowii),* **F:** Bsch. Grubbauer.
— **racemosa Rehd.** *(=E. grandiflora),* **H:** Ostchina, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Schloßberggärtnerei, Joanneumspark, Hilmteichstraße 120.

Fagus Tourn., Buche — *Fagaceae.*
— **sylvatica L.,** Rotbuche, häufig als niedrige bis hohe Hecken gepflanzt.
— — **asplenifolia Sweet., F:** Sanatorium Mariagrün, Bsch. Grubbauer.
— — **atropunicea West.,** Echte Blutbuche, **F:** Stadtpark, Geidorf: Scheidtenbergergasse Nr. 7 (Naturschutz!), Mariatrosterstraße 194 (Naturschutz!), Bsch. Grubbauer (dort auch var. *Swat Magret und* var. *tricolor).*
— — **castaneaefolia Bean., F:** Bsch. Grubbauer.
— — **fastigiata K. Koch.** *(=F. sylvatica dawyckii),* breit pyramidaler Baum, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **laciniata Vignet,** Schlitzblättrige Buche, **F:** Stadtpark: nächst Mozartdenkmal, Schubertstraße.
— — **pendula Loud.,** Hänge- oder Trauerbuche, **F:** Stadtpark: beim Brunnen, Am Schönborngrund, Bsch. Grubbauer.

Ficus L., Feige — *Moraceae.*
— **carica L.,** Feigenbaum, **H:** Westasien, **F:** Schloßberg: Herbersteingarten.

Fontanesia Labill., Fontanesie — *Oleaceae.*
— **fortunei Carr., H:** China, **F:** Bot. G.

Forsythia Vahl., Goldglöckchen — *Oleaceae.*
— **europaea Deg. et Bald., H:** Albanien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **intermedia Zabl.** *(=F. suspensa* x *viridissima),* **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer (und var. *spectabilis,* var. *vitellina),* Bsch. Ecker (und var. *spectabilis),* Bsch. Kern (var. *spectabilis).*
— **ovata Nakai, H:** Korea, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **suspensa Vahl, H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **fortunei Rehd., F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Grubbauer.
— — **sieboldii Zabl., F:** Bsch. Ecker und Grubbauer.
— **viridissima Ldl., H:** China, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Grubbauer.
Forsythien werden in Anlagen (Schloßberg, Stadtpark) und Gärten häufig einzeln oder in Hecken und auch in Bäumchenform (z. B. Grazbachgasse, Triesterstraße) gepflanzt.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Fraxinus L., Esche — *Oleaceae.*

— **chinensis rhynchophylla Hemsl.**, Schnabel-Esche, **H:** China, Mandschurei, Korea, Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **ornus L.**, Blumen-Esche, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegen Zinzendorfgasse.

— **oxycarpa Willd.**, Spitzfrüchtige Esche, **H:** Südeuropa bis Persien und Turkestan, **F:** Bot. G.

— **paxiana Lingelsh.**, **H:** China, Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **quadrangulata Michx.**, Blau-Esche, **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G.

Genista L., Ginster — *Leguminosae.*

— **aethnensis DC.**, Aetna-Ginster, **H:** Sizilien, Korsika, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **radiata Scop.**, Strahlen-Ginster, **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **tinctoria L.**, Färber-Ginster, **H:** Europa bis Westasien, **F:** Bsch. Kern (*G. tinctoria* fl. pl.).

Gleditsia L., Lederhülsenbaum, Gleditschie — *Leguminosae.*

— **triacanthos L.**, „Christusdorn", **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark, Baiernstraße (Hecke), Gaisbergstraße, Bsch. Kern.

Grewia L., Grewie — *Tiliaceae.*

— **biloba parviflora Hand.-Mazz.**, **H:** Nordchina, Korea, **F:** Bot. G.

Gymnocladus L., Schusser- oder Geweihbaum — *Leguminosae.*

— **dioicus K. Koch** (=*G. dioeca*, =*G. canadensis*), **H:** mittlere und östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: Weg von der Franck-Eiche zum Glacis, beim Blumenpavillon.

Halimodendron Fisch., Salzstrauch — *Leguminosae.*

— **argenteum Fisch.** (=*H. halodendron*), **H:** Transkaukasien bis Turkestan und Altai, **F:** Bot. G.

Hamamelis L., Zaubernuß — *Hamamelidaceae.*

japonica S. et Z., Japanische Zaubernuß, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.

— **virginiana L.**, Virginische Zaubernuß, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, beim Schillerdenkmal (Stadtpark), Bsch. Thalhammer.

Helianthemum Adans., Sonnenröschen — *Cistaceae.*

Zahlreiche Gartenformen vielfältigen Ursprungs, **F:** Schloßberg: Felsensteig links, Herbersteingarten u. a.

Hibiscus L., Eibisch — *Malvaceae.*

— **syriacus L.**, Syrischer Eibisch, **H:** Indien, China, **F:** Bot. G., Schloßberg: beim Türkenbrunnen, vor dem Opernhaus, Stadtpark, Joanneumsgarten, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer. — Zahlreiche Gartensorten mit einfachen und gefüllten Blüten.

Hippophaë L., Sanddorn — *Elaeagnaceae.*

— **rhamnoides L.**, Gemeiner Sanddorn, **H:** Europa bis Nordchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Göstinger-Au am Murufer (Brunner H., seit 1938), Baierdorf (Gärtnerei Oswald).

— **salicifolia D. Don.**, Weidenblättriger Sanddorn, **H:** Himalaja, **F:** Hochsteinstraße: Anna-Schloß, Schloßberg.

Hydrangea L., Hortensie — *Saxifragaceae.*

— **arborescens L.**, Baumartige Hortensie, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Kern; öfters in Anlagen und Gärten.

— **cinerea sterilis Rehd.**, **H:** Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **heteromalla Don.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
— **paniculata Sieb.**, Rispige Hortensie, **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Grubbauer und Thalhammer; oft in Vorgärten.
— **petiolaris S. et Z.**, Kletter-Hortensie *(=H. scandens)*, **H:** Japan, China, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
— **quercifolia Bartr.**, Eichenblättrige Hortensie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **sargentiana Rehd.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Kern.

Hypericum L., Johanniskraut, Hartheu — *Guttiferae.*
— **frondosum Mchx.**, **H:** südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **hircinum L.**, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Kern.
— **hookerianum Wight. et Arn.**, **H:** Sikkim, Westchina, **F:** Bot. G.
— **moseranum André** *(=H. calycinum x patulum)*, **F:** Bsch. Thalhammer und Ecker.
— **patulum henryi Bean**, **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.

Idesia Maxim., Orangenkirsche — *Flacourtiaceae.*
— **polycarpa Maxim.**, **H:** Südjapan, Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G.

Ilex L., Hülsen, Stechpalme —*Aquifoliaceae.*
— **aquifolium L.**, **H:** westliches Mittel- und Südeuropa, Nordafrika, Westasien bis China, **F:** Bot. G., Ragnitztal: Marienhof, Rosenberg 38 und 59, Schönbrunngasse, Jakob-Dirnböck-Gasse, Bsch. Grubbauer (dort auch *I. aquifolium foxii* und *I. aquifolium aureo-marginata)*, Bsch. Kern.
— **crenata Thunb.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **pernyi Franch.**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Mälzerweg (Rudersdorf), Am Grabenwald.
— **verticillata Gray.**, **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Indigofera L., Indigostrauch — *Leguminosae.*
— **gerardiana Wall.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.

Itea L., Rosmarinweide — *Saxifragaceae*
— **virginica L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

Jasminum L., Echter Jasmin — *Oleaceae.*
— **beesianum Forrest et Diels.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Am Grabenwald.
— **nudiflorum Ldl.**, Winter-Jasmin, **H:** China, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Am Grabenwald, Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
— **officinale L.**, Gebräuchlicher Jasmin, **H:** Persien bis China, **F:** Bot. G.

Juglans L., Walnuß — *Juglandaceae.*
— **cinerea L.**, Butternuß, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtpark: gegen Harrachgasse.
— **nigra L.**, Schwarznuß, **H:** östliche und südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
— **regia L.**, Welsche Nuß, Edle Walnuß, **H:** Südosteuropa bis China, **F:** Bot. G., Schloßberg: Westhang, Plabutsch u. a., Bsch. Grubbauer. — Von Formen sei erwähnt:
— — **praepaturiens Pepin**, Strauchnuß *(=J. regia* var. *fertilis)*, **F:** Am Grabenwald, Bsch. Grubbauer.

Kalmia L., Lorbeerrose — *Ericaceae.*
— **latifolia L.**, Breitblättrige Lorbeerose, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

Kerria DC., Kerrie — *Rosaceae.*
— **japonica DC.**, **H:** Japan, China, **F:** Bot. G. (einfach und gefüllt), Stadtpark, Schloßberg: Abgang zur Wickenburggasse (einfach), Bsch. Ecker und Thalhammer; meist in der gefüllten Form in den Gärten.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Koelreuteria Laxm., Blasenbaum — *Sapindaceae.*
— **paniculata Laxm.**, **H:** China, Korea, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Kolkwitzia Graebn., Kolkwitzie — *Caprifoliaceae.*
— **amabilis Graebn.**, **H:** China, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Laburnocytisus C. Sch. — *Leguminosae.*
— **adami C. Schn.**, Pfropfbastard (Chimäre): *Laburnum anagyroides* x *Cytisus purpureus*, **F:** Bot. G.

Laburnum Med., Goldregen — *Leguminosae.*
— **alpinum Bercht. et Prsl.**, Alpen-Goldregen, **H:** Gebirge des südlichen Mittel- und Südeuropa, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **anagyroides Med.**, Gemeiner Goldregen (=*L. vulgare*), **H:** südliches Mittel- und Südeuropa, **F:** Bot. G., Schloßberg u. a., Bsch. Ecker und Kern.
— **watereri Dipp.** (=*L. anagyroides* x *alpinum*), **F:** Rudersdorf: Mälzerweg.

Lavandula L., Lavendel — *Labiatae.*
— **officinalis Chaix.** (=*L. vera*, =*L. spica*), **H:** Südeuropa, Nordafrika, **F:** Bot. G.; oft in Gärten.

Lespedeza Michx., Buschklee — *Leguminosae.*
— **bicolor Turcz.**, **H:** Nordchina bis Mandschurei und Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **thunbergii Nakai** (=*L. sieboldii*, =*Desmodium penduliflorum*), **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Burggarten: Abhang gegen das Wasserbecken im Stadtpark, Bsch. Grubbauer, Ecker, Kern und Klenert.

Ligustrum L., Rainweide, Liguster — *Oleaceae.*
— **delavayanum Hariot** (=*L. prattii*), **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **obtusifolium S. et Z.** (=*L. ibota*), **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Klenert.
— **ovalifolium Hassk.**, Eiblättriger Liguster, **H:** Japan, **F:** Oft als wintergrüne Hecke, z. B. Bayernstraße; Bsch. Ecker, Klenert, Grubbauer und Thalhammer.
— **vulgare argenteo-variegatum West.** (=*L. vulgare* var. *albovariegatum*), Blätter weiß gescheckt, **H:** Europa, Nordafrika, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **vulgare nanum Rehd.** (=*L. lodense*), eine niedrige, dichte Form, **F:** Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.
— **walkeri Dunc.**, **H:** Ostindien, **F:** Bsch. Grubbauer (immergrün).

Lindera Thunb., Fieber- oder Benzoëstrauch — *Lauraceae.*
— **benzoïn Bl.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

Liquidambar L., Amberbaum — *Hamamelidaceae.*
— **styraciflua L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G. (=*L. styraciflua suberosa*), Stadtpark: Ecke Elisabethstraße zur Hauptallee, Bsch. Grubbauer.

Liriodendron L., Tulpenbaum — *Magnoliaceae.*
— **tulipifera L.**, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark: Weg vom Anastasius-Grün-Denkmal gegen Attemsgasse, Ecke Elisabethstraße zur Hauptallee, Rosenhain, Bsch. Grubbauer.

Lonicera L., Heckenkirsche, Geißblatt — *Caprifoliaceae.*
— **alseuosmoides Graebn.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **amoena Zbl.** (=*L. tatarica* x *korolkowii*), **F:** Bsch. Grubbauer.
— **arborea Boiss.**, **H:** Spanien, Nordafrika, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **bella Zbl.** (=*L. tatarica* x *morrowii*), **F:** Bsch. Ecker.
— **brownii fuchsioides Rehd.**, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Bsch. Grubbauer und Kern.
— **brownii plantierensis Rehd.**, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **caprifolium L.**, Jelängerjelieber, **H:** Europa, Westasien, **F:** Bot. G., Am Grabenwald (verwildert?) u. a.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **chaetocarpa Rehd.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **chrysantha Turcz.**, Gelbblütige Heckenkirsche, **H:** Nordostasien, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **coerulea L.**, Blaufrüchtige Heckenkirsche, **H:** Mittel- und Nordeuropa, Nordasien bis Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **etrusca Santi**, Etrurische Heckenkirsche, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **fragrantissima Ldl. et Paxt.**, Duftende Heckenkirsche, **H:** Ostchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **glauca Hill.**, Blaugrüne Heckenkirsche *(=L. dioica)*, **H:** Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **glaucescens Rydb.**, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **gracilipes Miq.**, Feinstielige Heckenkirsche, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **henryi Hemsl.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
— **korolkowii Stapf.**, **H:** Turkestan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **maackii Maxim.**, **H:** Korea, Mandschurei, **F:** Bot. G. (var. *podocarpa)*, Bsch. Grubbauer (beide).
— **maximowiczii Reg.**, **H:** Korea, Mandschurei, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **nitida Wils.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G., Plabutscherstraße, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.
— **notha Zbl.** *(=L. tatarica* x *ruprechtiana)*, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker.
— **orientalis caucasica Zbl.** *(=L. schmitziana)*, **H:** Transkaukasien, Armenien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **orientalis longifolia Dipp.**, **H:** Kamtschatka, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **pileata Oliv.**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Plabutscherstraße, Bsch. Ecker, Klenert und Thalhammer.
— **prolifera Rehd.** *(=L. sullivantii)*, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Klenert.
— **purpusii Rehd.** *(=L. fragrantissima* x *standishii)*, **F:** Mälzerweg, Am Grabenwald, Bsch. Grubbauer.
— **spinosa albertii Rehd.** *(=L. alberti)*, **H:** Turkestan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Klenert.
— **standishii Carr.**, **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **tatarica L.**, Tatarische Heckenkirsche, **H:** Südrußland bis Mittelasien, **F:** lange Hecke Am Grabenwald, Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
— **tibetica Bur. et Franch.**, Tibetische Heckenkirsche, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
— **xylosteum L.**, Gemeine Heckenkirsche, **H:** Europa bis Altai, **F:** Bot. G., Hilmteich bis Hilmwarte, Schöckel, Bsch. Grubbauer.

Lycium L., Bocksdorn — *Solanaceae.*
— **europaeum L.**, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **halimifolium Mill.**, Gemeiner Bocksdorn, **H:** Südosteuropa bis Westasien, **F:** Bot. G., Schloßberg: Basteimauer. — Leicht verwildernd.
— **barbarum L.**, **H:** West- und Südeuropa, Vorderasien, **F:** Bot. G.

Maclura Nutt., Osagedorn — *Moraceae.*
— **aurantiaca Nutt.** *(=M. pomifera)*, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Magnolia L., Magnolie — *Magnoliaceae.*
— **acuminata L.**, Gurken-Magnolie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
— **denudata Desrouss.**, Yulan-Magnolie *(=M. yulan)*, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Stadtpark: östlich des kleinen Rondells.
— **grandiflora L.**, **H:** südliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **kobus Thbg.**, **H:** Japan (Hondo), **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
— **obovata Thbg.**, Ho- oder Rote Magnolie *(=M. hypoleuca)*, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
— **soulangeana Soul.** *(=M. denudata* x *liliflora)*, **F:** Schubertstraße, Grasberger-

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

straße, Stadtpark. — Unter *M. soulangeana* gehen verschiedene Kulturformen, wie z. B.
— — **lennei Rehd.**, **F:** Bot. G., Stadtpark: Rondell gegenüber Trauerweide (rosa Blüte).
— **stellata Maxim.**, Stern-Magnolie, **H:** Japan, **F:** Bot. G. (und var. *rosea*), Muchargasse, Bergmanngasse, Hilmteichstraße, Joanneumgarten, Bsch. Klenert (besonders schön).
— **tripetala L.**, Schirm-Magnolie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloß Kroisbach.

Mahoberberis C. Schn. (=*Mahonia* x *Berberis*) — *Berberidaceae.*
— **neubertii C. Schn.** (=*Berberis vulgaris* x *Mahonia aquifolium*), **F:** Bot. G.

Mahonia Nutt., Mahonie — *Berberidaceae.*
— **aquifolium Nutt.**, Glanzblättrige Mahonie, **H:** westliches Nordamerika, **F:** häufig angepflanzter immergrüner Strauch (für Kränze) mit vielen, auch buntblättrigen Formen; auf Friedhöfen, im Burggarten, Bsch. Ecker und Kern.
— **bealei Carr.** (=*M. japonica*), **H:** China, **F:** Bsch. Kern.
— **repens G. Don.**, Kriechende Mahonie, **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.

Malus Mill., Apfelbaum — *Rosaceae.*
Die Zieräpfelbäume bilden zahlreiche Bastarde, wodurch ihre Bestimmung sehr erschwert ist.
— **arnoldiana Sarg.** (=*M. floribunda* x *baccata*), **F:** Bsch. Grubbauer.
— **baccata Borkh.**, Beerentragender Apfelbaum (=*Pirus baccata*), **H:** Nordostasien bis Nordchina, **F:** Bot. G., Rosarium, Bsch. Grubbauer.
— — **mandschurica C. Schn.**, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **halliana Koehne**, Halls-Apfelbaum, **H:** Japan, China, **F:** Universität.
— **hupehensis Rehd.**, **H:** China, Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **micromalus Mak.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **prunifolia Borkh.**, Pflaumenblättriger Apfelbaum, **H:** Nordostasien, **F:** Bot. G.
— **pumila Mill.**, Paradies- oder Johannis-Apfelbaum, **H:** Europa, Westasien, **F:** Bot. G. (*M. pumila pendula*), Bsch. Grubbauer.
— — **niedzwetzkyana C. Schn.**, **F:** Bsch. Klenert.
— **purpurea Rehd.** (=*M. pumila niedzwetzkyana* x *atrosanguinea*), **F:** Bot. G.
— — **aldenhamensis Rehd.**, **F:** Bsch. Ecker.
— — **lemoinei Rehd.**, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **Ökonomierat Echtermayer** (=*Excellenz Thiel* x *niedzwetzkyana*), **F:** Bsch. Kern.
— **sargenti Rehd.**, **H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **scheideckeri Zbl.** (=*M. floribunda* x *prunifolia*), **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Thalhammer.
— **sieboldii Rehd.** (=*Malus toringo*, =*Pirus toringo*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **zumi Rehd.** (=*M. baccata mandschurica* x *sieboldii*), **F:** Bsch. Grubbauer.

Menispermum L., Mondsame — *Menispermaceae.*
— **canadense L.**, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **dahuricum DC.**, **H:** Sibirien, Mongolei, China, **F:** Bot. G.

Mespilus L., Mispelbaum — *Rosaceae.*
— **germanica L.**, Gemeiner Mispelbaum, **H:** Südosteuropa (Südtirol) bis Persien, **F:** Bot. G., hie und da in Gärten, z. B. Körblergasse, Lindweg, Rosenberg.

Morus L., Maulbeerbaum — *Moraceae.*
— **alba L.**, Weißer Maulbeerbaum, **H:** China, **F:** Bot. G., Weg vom Karmeliterkloster, Bahnstraße (Gösting), Taubstummeninstitut u. a., Bsch. Kern.
— **nigra L.**, Schwarzer Maulbeerbaum, **H:** Westasien, **F:** Bot. G., Rosenberg beim Kreuzwirt, Bsch. Kern.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Myrica L., Gagelstrauch — *Myricaceae.*
— **caroliniensis Mill.** (=*M. cerifera* der meisten Gärten), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **cerifera L.**, Wachsmyrte, **H:** südwestliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.

Myricaria Desv., Rispelstrauch, Uferheide — *Tamaricaceae.*
— **germanica Desv.**, Deutscher Rispelstrauch, Deutsche Tamariske, **H:** Mittel- und Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G.

Neillia D. Don., Traubenspiere — *Rosaceae.*
— **affinis Hemsl.**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.

Neviusia A. Gray, Schneelocke — *Rosaceae.*
— **alabamensis A. Gray**, **H:** Alabama, **F:** Bot. G.

Osmaronia Greene, Oregonpflaume — *Rosaceae.*
— **cerasiformis Greene** (=*Nuttallia cerasiformis*), **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Ostrya Scop., Hopfenbuche — *Betulaceae.*
— **carpinifolia Scop.**, **H:** Südeuropa (nördlich bis Tirol, Südkärnten und Oststeiermark) ostwärts bis Kleinasien, **F:** Bot. G.

Pachysandra Mchx. — *Buxaceae.*
— **terminalis S. et Z.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Mälzerweg, Bsch. Kern.

Paeonia L., Pfingstrose — *Ranunculaceae.*
— **lutea Franch.**, Gelbe Pfingstrose, **H:** China, **F:** Bot. G.
— **suffruticosa Andr.**, Baumpäonie (=*P. arborea*), **H:** Nordwestchina, viele Kulturformen meist japanischer Herkunft, **F:** in Vorgärten, in Graz-St. Peter (Besitz Friedel), Am Grabenwald, Mälzerweg.

Paliurus Mill., Stechdorn, Christdorn — *Rhamnaceae.*
— **spina-christi Mill.** (=*P. australis*), **H:** Südeuropa (Südtirol) bis Himalaja und Nordchina, **F:** Bot. G.

Parthenocissus Planch., Jungfernrebe — *Vitaceae.*
— **henryana Diels et Gilg.** (=*Vitis henryana*, =*Ampelopsis henryana*), **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G.
— **himalayana Planch.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.
— **inserta K. Fritsch**, Wilder Wein (=*P. vitacea*, *Ampelopsis quinquefolia*), **H:** Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G. und in vielen Gärten; verwildert in den Murauen südlich Graz.
— **quinquefolia Planch.**, Gemeine Jungfernrebe, in den Gärten meist als *P. hederacea*, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, Ostkanada, **F:** Schloßberg: Basteimauer, Schloßbergplatz am Stiegengeländer, Bsch. Grubbauer.
— — **engelmannii Rehd.**, Selbstkletternde Jungfernrebe (=*Ampelopsis engelmannii*), **F:** Bsch. Grubbauer und Thalhammer.
— — **murorum Rehd.** (=*Parthenocissus* und *Ampelopsis radicantissima*, =*Ampelopsis hederacea*, =*Ampelopsis muralis*), **F:** Bot. G.
— **tricuspidata veitchii Rehd.**, wird als Jugendform von *P. tricuspidata* angesehen. **H:** Japan, Mittelchina, **F:** Ecke Leechgasse—Lenaugasse, Alte Poststraße (Eckert), Schubertstraße, Bleistiftfabrik Gösting u. a., Bsch. Grubbauer und Klenert.

Paulownia S. et Z., Paulownie, Blauglockenbaum — *Scrophulariaceae.*
— **tomentosa Steud.**, Kaiser-Paulownie, **H:** China, **F:** Ecke Rosarium—Hamerlinggasse, Körblergasse 76, Stadtgärtnerei, Augarten: drei Bäumchen beim Musikpavillon, Stadtpark: beim Musikpavillon, Café Rosenhain.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Periploca L., Baumschlinge — *Asclepiadaceae.*
— **graeca L.**, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Pernettya Gaudich., Torfmyrte — *Ericaceae.*
— **mucronata Gaud.**, Stachelspitzige Torfmyrte, **H:** Chile bis Feuerland, **F:** Bsch. Kern.

Perowskia Karel., Perowskie — *Labiatae.*
— **atriplicifolia Benth.**, Meldenlaubige Perowskie, **H:** Tibet und Westhimalaja bis Transkaspien, **F:** Bot. G.

Petteria Presl., Petterie — *Leguminosae.*
— **ramentacea Presl.**, **H:** Istrien bis Albanien, **F:** Bot. G.

Phellodendron Rupr., Korkbaum — *Rutaceae.*
— **japonicum Maxim.**, **H:** Mitteljapan, **F:** Bot. G.

Philadelphus L., Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin — *Saxifragaceae.*
— **congestus Rehd.**, *(=P. verrucosus* x *laxus)*, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **coronarius L.**, Gemeiner Pfeifenstrauch *(=P. pallidus)*. — An vielen schwer zu unterscheidenden Hybriden beteiligt. **H:** Italien bis Kaukasus, **F:** Bot. G., Stadtpark, Gösting: Jungfernsprung, Reliktstandort! Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer. — Häufig und verbreitet.
— **falconeri Sarg.** *(=P. coronarius* x *laxus?)*, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **floribundus Schrad.**, Blütenreicher Pfeifenstrauch *(=P. coronarius* x *gordonianus)*, **F:** Bsch. Grubbauer, Stadtgärtnerei.
— **lemoinei Lem.** *(=P. microphyllus* x *coronarius)*, mehrere Gartenformen (auch solche anderen Ursprungs gehen unter diesem Namen), **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern, Leodolter und Thalhammer.
— **microphyllus Gray.**, Kleinblättriger Pfeifenstrauch, **H:** südwestliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **polyanthus Rehd.** *(=P. lemoinei* x *insignis?)*, **F:** Bsch. Grubbauer *(P. polyanthus Pavillon blanc)*.
— **pubescens Lois.**, Weichhaariger Pfeifenstrauch *(=P. latifolius)*, **H:** Tennessee bis Alabama, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker.
— **purpureo-maculatus Lem.** *(=P. lemoinei* x *coulteri)*, **F:** Bsch. Grubbauer *(P. purpureo-maculatus Belle Etoile)*.
— **tomentosus Wall.**, Filziger Pfeifenstrauch, **H:** Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **virginalis Rehd.** *(=P. lemoinei* x *nivalis plenus? = P. lemoinei Virginal)*, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Kern.

Physocarpus Maxim., Blasenspiere, Blasenfrucht — *Rosaceae.*
— **amurensis Maxim.**, Amur-Blasenspiere, **H:** Mandschurei, Korea, **F:** Stadtgärtnerei.
— **capitatus Kuntze**, Weichhaarige Blasenspiere *(Spiraea* oder *Neillia capitata)*, **H:** westliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **opulifolius Maxim.**, Schneeballblättrige Blasenspiere, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Leechwald, Bsch. Ecker. — Sonst als Hecke häufig gezogen.

Pieris D. Don. *(=Andromeda)*, Lavendelheide, Kienporst — *Ericaceae.*
— **japonica D. Don.**, Japanische Lavendelheide, **H:** Japan, **F:** Bsch. Klenert.

Pyrus L. *(=Pirus)*, Birnbaum — *Rosaceae.*
— **amygdaliformis Vill.**, Mandelblättriger Birnbaum, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **salicifolia Pall.**, Weidenblättriger Birnbaum, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Opernring.
— **ussuriensis Maxim.**, **H:** Nordostasien, **F:** Bsch. Grubbauer.

Platanus L., Platane — *Platanaceae.*
— **acerifolia Willd.** *(=P. occidentalis* x *orientalis)*, die am meisten gepflanzte

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Platane, **F:** Stadtpark, Eggenbergerallee und Schloßpark, Bsch. Grubbauer.

— **orientalis L.,** Morgenländische Platane, **H:** Südosteuropa bis Westasien, **F:** Stadtpark, Mariatrosterstraße 194 (zwei Exemplare — Naturschutz!), Bsch. Grubbauer.

Polygonum L., Knöterich — *Polygonaceae.*

— **aubertii L. Henry, H:** Westchina, **F:** Bot. G., Schönaugasse (vor einem Gasthaus in Holzgefäßen), Schloßberg: Garten unter dem Uhrturm, Bsch. Kern und Ecker.

— **baldschuanicum Reg., H:** Bucharei, **F:** Schloßbergkai, Resselgasse u. a., Bsch. Ecker und Grubbauer.

Poncirus Raf. *(=Citrus),* Zitrone — *Rutaceae.*

— **trifoliata Raf.,** Dreiblättrige Zitrone oder Agrume *(=Citrus trifoliata = C. triptera),* **H:** Japan, Korea, Nordchina, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Grasbergerstraße.

Populus L., Pappel — *Salicaceae.*

— **alba nivea Ait.,** Silber- oder Weißpappel, Jugendform von *P. alba,* **H:** Mittel- und Südeuropa bis Mittelasien, **F:** Stadtpark: Nähe des Hamerlingdenkmals.

— **canadensis Moench.,** Kanadische Pappel *(=P. deltoides* x *nigra),* **F:** Bsch. Klenert.

— **candicans Ait.,** Ontario-Pappel, **H:** Ursprung unbekannt, **F:** Bot. G.

— **koreana Rehd., H:** Korea, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **lasiocarpa Oliv., H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer und Klenert.

— **nigra L.,** Schwarzpappel, **H:** Europa, Westasien, **F:** Stadtpark, Schloßberg, Augarten, Eggenberger Schloßpark u. a., Bsch. Grubbauer.

— — **italica Muenchh.,** Pyramiden-Pappel *(=P. pyramidalis, =P. fastigiata),* **H:** wahrscheinlich Mittelasien, **F:** Paulustorgasse, Stadtpark: Nähe des Anastasius-Grün-Denkmals, Schanzelgasse, Eggenberger Stadion u. a., Bsch. Grubbauer und Kern.

— **simonii Carr.,** Chinesische Pappel, **H:** Nordchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— — **fastigiata C. Schn., F:** Bsch. Grubbauer.

— **szechuanica C. Schn., H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **tacamahaca Mill.,** Balsam-Pappel *(=P. balsamifera),* **H:** Labrador bis Alaska und nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.

Potentilla L., Fingerkraut, Fingerstrauch — *Rosaceae.*

— **fruticosa L.,** Gemeines Fingerkraut, **H:** nördliche Halbkugel, **F:** Bot. G., Schloßberg, Stadtgärtnerei u. a., Bsch. Ecker und Thalhammer.

— — **farreri Besant, H:** Nordwestchina, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.

Prinsepia Royle — *Rosaceae.*

— **uniflora Batal., H:** Nordwestchina, **F:** Bot. G.

Prunus L., Kirsch-, Mandel-, Pfirsich-, Pflaumenbaum — *Rosaceae.*

Von den Zierkirschen gibt es viele Formen (besonders von *P. serrulata)* mit einfachen und gefüllten Blüten.

— **amygdalus Batsch.,** Echte Mandel *(=Amygdalus communis),* **H:** Vorderasien, Nordafrika, **F:** Bot. G., Schloßberg: Terrasse unter Kanonenbastei.

— **blireana André** *(=P. cerasifera* x *mume),* **F:** Bsch. Grubbauer.

— **canescens Bois., H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **cerasifera atropurpurea Jaeg.,** Blutpflaume *(=P. cerasifera* var. *pissardii),* **F:** Schloßberg: Herbersteingarten, ober dem Krebsenkeller u. a., Bsch. Grubbauer.

— — **woodii Spaeth, F:** Stadtgärtnerei, Hecke im Urnenhain des Krematoriums, Bsch. Grubbauer.

— **cerasus L.,** Sauerkirsche, **H:** Südosteuropa und Westasien, viele Formen, **F:** Bot. G.

— **glandulosa Thunb.,** Drüsenzähnige Kirsche *(=P. japonica),* **H:** Mittel- und Nordchina, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Grubbauer und Kern.

— **incisa Thunb., H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **japonica Thunb.**, **H:** Mittelchina, Ostasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer und Thalhammer.
— **nipponica kurilensis Wils.**, **H:** Yezo, Kurilen, Sachalin, Nord-Hondo, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **laurocerasus caucasica Zbl.**, Kirschlorbeer, **H:** Südosteuropa bis Kaukasus, **F:** Bsch. Klenert.
— — **schipkaensis Zbl.**, Balkan-Kirschlorbeer, **H:** Bulgarien, **F:** Bsch. Klenert, Am Grabenwald.
— **maximowiczii Rupr.**, **H:** Mandschurei, Korea, Japan, **F:** Bot. G.
— **padus L.**, Gemeine Traubenkirsche, **H:** Europa, Nordasien bis Korea und Japan, **F:** Schloßberg, Bergstraße u. a.
— **pumila L.**, Sandkirsche, **H:** nordöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **salicina Ldl.**, **H:** China, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **sargentii Rehd.** *(=P. serrulata sachalinensis)*, **H:** Japan, Sachalin, **F:** Bot. G.
— **serrulata Ldl.**, Japanische Kirsche, **H:** Japan, China, Korea. — Viele Formen meist japanischer Herkunft:
— — **lannesiana Rehd.**, **F:** Bot. G., Rosenhain, Schloßberg: Herbersteingarten, Allee vom Franzosenkreuz zum Uhrturm, Joanneumgarten, Zentralfriedhof, Bsch. Grubbauer, Ecker und Thalhammer.
— **spinosa purpurea André**, Schlehdorn, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **subhirtella Miq.**, **H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer (auch *f. autumnalis* und *plena)*.
— **tenella Batsch.**, Zwergmandel, **H:** östliches Mitteleuropa bis Ostsibirien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **tomentosa Thunb.**, **H:** China, Japan, Himalaja, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **triloba Ldl.**, Chinesische Mandelaprikose, Mandelbäumchen, **H:** China, **F:** Bot. G., Stadtpark mehrfach, Bsch. Ecker, Bsch. Grubbauer (meist in der gefüllten Form: *P. triloba multiplex)*.
— **virginiana L.**, Virginische Traubenkirsche, **H:** östliches und mittleres Nordamerika, **F:** Bot. G.

Ptelea L., Hopfenstrauch — *Rutaceae.*
— **trifoliata L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Gartengasse (Liebenau), Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker und Grubbauer.

Pterocarya Kunth, Flügelnuß — *Juglandaceae.*
— **fraxinifolia Spach.**, **H:** Kaukasus bis Nordpersien, **F:** Bot. G., Stadtpark: Wiese in der Nähe des Franck-Denkmals, Schloß Klingenstein, Bsch. Grubbauer.

Pyracantha Roem., Feuerdorn — *Rosaceae.*
— **angustifolia C. Schn.**, **H:** Südwestchina, **F:** Bot. G.
— **coccinea Roem.**, **H:** Italien bis Westasien, **F:** Bot. G., Stadtparkbrunnen, Schloßberg unter dem Uhrturm, Bsch. Grubbauer (und *P. coccinea* f. *Kasan)*, Bsch. Kern.
— **crenulata Roem.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer *(P. crenulata rogersiana)*.

Quercus L., Eiche — *Fagaceae.*
— **alba L.**, Weißeiche, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **bicolor Willd.**, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **borealis maxima Ashe.** *(=Q. rubra Du Roi)*, dies ist die in den Baumschulen übliche Roteiche! **H:** östliches Nordamerika, **F:** Stadtpark: Weg vom Wetterhäuschen zur Einspinnergasse, Schloß Hart bei Thal, Bsch. Grubbauer und Klenert. — Auch sonst nicht selten kultiviert.
— **castaneaefolia C. A. Mey.**, Kastanienblättrige Eiche, **H:** Kaukasien, Persien **F:** Bot. G.
— **dentata Thunb.**, Kaiser-Eiche, **H:** Japan, Korea, China, **F:** Rosenberg, Minoritenschlößl.
— **falcata Mchx.**, Spanische Eiche *(=Q. rubra L.)*, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **leana Nutt.** *(=Q. imbricaria x velutina)*, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **libani Oliv.**, Libanon-Eiche, **H:** Syrien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **macrocarpa Mchx.**, Kletten-Eiche, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **palustris L.**, Sumpf-Eiche, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., vor dem chemischen Institut der Universität, Rosenberg, Mariagrün, Bsch. Grubbauer.
— **petraea Liebl.**, Trauben-, Stein- oder Winter-Eiche *(=Q. sessilis, =Q. sessiliflora)*, **H:** Europa, Westasien, **F:** Lindweg 33. — Verbreitet (z. B. Schöckel).
— **pontica K. Koch**, **H:** Armenien, Kaukasus, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **robur L.**, Sommer- oder Stiel-Eiche, **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer. — Verbreitet (z. B. Schöckel).
— — **fastigiata Schwarz**, Pyramiden-Eiche, **F:** Stadtpark, Leonhardstraße 58 (Naturschutz!).
— — **pectinata K. Koch**, **F:** Bsch. Ecker.
— **velutina Lam.**, Färber- oder Schwarz-Eiche *(=Q. tinctoria)*, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

Rhamnus L., Kreuzdorn, Faulbaum — *Rhamnaceae.*
— **cathartica L.**, Gemeiner Kreuzdorn, **H:** Europa, West- und Nordasien, **F:** Bot. G. — Verbreitet.
— **crenata S. et Z.**, **H:** Japan, Korea bis Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **saxatilis Jacq.**, Felsen-Kreuzdorn, **H:** Mittel-, Süd- und Südosteuropa, **F:** Bot. G.

Rhododendron L., Alpenrose, Azalee — *Ericaceae.*

Ungefähr tausend Arten mit Hunderten von Kreuzungen, die z. T. in Vorgärten und Gärten der Stadt zu finden sind. Ich führe hier nur drei Arten an, die meist unter falschem Namen gehen, aber an vielen Kreuzungen beteiligt sind, beziehungsweise als Unterlage für Veredlungen verwendet werden.
— **catawbiense Mchx.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Kern.
— **flavum G. Don.**, Pontische Azalee *(=R. luteum,* nicht *Azalea lutea L., =A. pontica L.,* aber nicht *R. ponticum L.)*, **H:** Kleinasien, Kaukasus, Osteuropa, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **ponticum L.**, **H:** Kleinasien, Balkan, Spanien, Portugal, **F:** Bsch. Klenert.

Rhodotypus S. et Z., Scheinkerrie — *Rosaceae.*
— **scandens Mak.** *(=R. kerrioides)*, **H:** Japan, Mittelchina, **F:** Bot. G., Schloßberg, Göstingerstraße, Bsch. Ecker, Grubbauer (einfach und gefüllt).

Rhus L., Sumach — *Anacardiaceae.*
— **chinensis Mill.**, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G.
— **copallina L.**, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **radicans L.**, Gift- oder Efeu-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **toxicodendron L.**, Gift-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F.** Bot. G.
— **typhina L.**, Essigbaum, Hirschkolben-Sumach, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg: vom Starckehäuschen westwärts, Stadtgärtnerei, Stadtpark u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
— — **dissecta Rehd.** *(=R. typhina laciniata Manning)*, **F:** Bsch. Ecker und Grubbauer.
— — **laciniata Wood.**, **F:** am Schloßberg, beim Sockel des ehemaligen Sendemastes.
— **verniciflua Stokes**, Firnis- oder Lackbaum, **H:** Japan, China, Himalaja, **F:** Bot. G.

Ribes L., Johannisbeere, Ribisel, Stachelbeere — *Saxifragaceae.*
— **alpinum L.**, Alpen-Johannisbeere, **H:** Europa bis Kaukasus, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker und Thalhammer.
— **americanum Mill.**, Amerikanische Johannisbeere *(=R. floridum)*, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **aureum Pursh.**, Goldtraube, **H:** Mittel- und Westamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark (mehrfach), Schloß St. Martin, Bsch. Ecker.
— **fasciculatum S. et Z.**, Büschel-Johannisbeere, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G.
— **glaciale Wall.**, **H:** Nepal bis China, **F:** Bot. G.
— **glutinosum Benth.**, **H:** Kalifornien, **F:** hinter der Universität.
— **sanguineum Pursh.**, Blutrote Johannisbeere, echt wohl nicht in Kultur, aber in verschiedenen Formen, **H:** Britisch-Kolumbien bis Kalifornien, **F:** Bot. G., Johann-Fux-Gasse, Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.

Robinia L., Robinie, Falsche Akazie, Schotendorn — *Leguminosae.*
— **hispida L.**, Borstige Robinie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Rosarium, Joanneumgarten, Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
— **luxurians C. Schn.**, **H:** Kolorado bis Neumexiko, Arizona und Utah, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **pseudacacia L.**, Gemeine Robinie, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, in Europa häufig verwildert (z. B. Plabutsch, Roseggerweg), **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer. — Sehr formenreiche Art:
— — **decaisneana Carr.**, **F:** Bsch. Grubbauer.
— — **monophylla Carr.** *(=R. pseudacacia unifoliola)*, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Klenert.
— — **umbraculifera DC.**, Kugelakazie, **F:** vor der Elisabethinenkirche, Eckertstraße.
— **viscosa Vent.**, Klebrige Robinie, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Am Grabenwald, Bsch. Klenert.

Rosa L., Rose — *Rosaceae.*

Da es über 200 Arten (sog. Wildrosen) und Zehntausende von Gartenformen gibt, habe ich mich auf die Aufzählung einiger Wildrosen beschränkt. Viele Gartenformen sind nicht winterhart, gehören daher nicht hieher.

— **alba L.**, Weiße Rose, Herkunft unbekannt, **F:** Bot. G.
— **banksiae Ait.**, **H:** China, **F:** Bot. G.
— **blanda Ait.**, Virginische Rose, **H:** nördliche Vereinigte Staaten, Kanada, **F:** Bot. G.
— **centifolia L.**, Zentifolie, Kohlrose, **H:** Ostkaukasus, **F:** Schloßberg: Schweizerhaus, Türkenbrunnen.
— **chinensis Jacq.**, China- oder Bengal-Rose, hieher gehören die „Miniaturrosen", wie *R. rouletti Corr.*, **H:** China, **F:** Bot. G.
— **damascena Mill.**, Damaszener-Rose, **H:** Kleinasien, **F:** Bot. G.
— **foetida bicolor Willm.**, Kapuziner-Rose *(=R. lutea bicolor)*, **H:** Westasien, **F:** Grasbergerstraße, Bsch. Grubbauer.
— **hugonis Hemsl.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **moyesii Hemsl. et Wils.**, **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **multiflora Thunb.**, Büschel-Rose, **H:** Japan und China, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **omeiensis Rolfe**, **H:** Westchina, **F:** Bot. G.
— **rubrifolia Vill.**, Rotblättrige Rose, **H:** Gebirge Mittel- und Südeuropas, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **rugosa Thunb.**, Japanische Apfel- oder Runzel-Rose, Kartoffel-Rose, **H:** Nordchina, Korea, Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg: Felsensteig, Rosenberg: Minoritenschlößl, Harterstraße (Klusemannsiedlung), Bsch. Thalhammer (auch *R. rugosa alba).*
— **setigera Mchx.**, Prärie-Rose, **H:** Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **spinosissima L.**, Bibernell-Rose *(=R. pimpinellifolia)*, **H:** Europa, Westasien, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **virginiana Mill.**, Glänzende Rose *(=R. lucida)*, **H:** östliche Vereinigte Staaten und östliches Kanada, **F:** Bot. G.
— **wichuraiana Crép.**, Hiawatha-, Wichuras-Rose, **H:** Japan, Korea, Formosa, Ostchina, **F:** Grasbergerstraße, Am Grabenwald.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Rubus L., Brombeere, Himbeere — *Rosaceae.*
— **amabilis Focke, H:** Westchina, **F:** Bot. G.
— **henryi Hemsl., H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bot. G.
— **laciniatus Willd.**, Schlitzblättrige Brombeere, Herkunft unsicher, **F:** Bot. G.
— **occidentalis L.**, Abendländische Himbeere, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **odoratus L.**, Wohlriechende Himbeere, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Auersperggasse, Bsch. Ecker.
— **phoenicolasius Maxim.**, Japanische Weinbeere, **H:** Japan, Korea, Nordchina, **F:** Plabutscherstraße, Mälzerweg (Rudersdorf), Auersperggasse, Bsch. Ecker; öfters in Gärten.
— **tibetanus Franch., H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

Ruscus L., Mäusedorn — *Liliaceae.*
— **aculeatus L.**, Stechender Mäusedorn, **H:** West-, Süd- und Südosteuropa, Vorderasien bis Persien, Nordafrika, **F:** Schloßberg: Felsensteig.

Salix L., Weide — *Salicaceae.*
— **alba tristis Gaud.**, Trauer-Dotterweide *(=S. alba vitellina f. pendula)*, **F:** Stadtpark, Hilmteich, Schanzelgasse, Leechgasse, Göstingerstraße, Eggenberger Schloßpark u. a., Bsch. Kern, Klenert, Grubbauer und Thalhammer.
— **angustifolia Willd.**, Schmal-Weide, **H:** Kaukasus bis Ostasien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **babylonica L.**, Trauer-Weide, **H:** China, **F:** Hochsteinstraße: Anna-Schloß.
— **bebbiana Sarg., H:** nördliche Vereinigte Staaten und Südkanada, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **gracilistyla Miq., H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G.
— **herbacea L.**, Kraut-Weide, **H:** europäische Hochgebirge, nördliches und arktisches Europa, Nordasien, arktisches und boreales Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **irrorata Anderss., H:** westliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **matsudana tortuosa C. Schn., H:** Transbaikalien, Nordchina, Mandschurei, Korea, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **pentandra L.**, Lorbeer-Weide, **H:** Europa bis Kaukasus, **F:** Bot. G.
— **phylicifolia L.**, Zweifarbige Weide *(=S. bicolor)*, **H:** Europa bis Nordostasien, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **reticulata L.**, Netz-Weide, **H:** europäisches Gebirge, Nordasien, arktisches Nordamerika, **F:** Bot. G.
— **retusa L.**, Stutz-Weide, **H:** europäische Gebirge, Altai, **F:** Bot. G.

Sambucus L., Holunder — *Caprifoliaceae.*
— **canadensis L.**, Kanadischer Holunder, **H:** östliche Vereinigte Staaten, Südost-Kanada, **F:** Bsch. Ecker und Grubbauer.
— **coerulea Raf., H:** westliches Nordamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **nigra albo-variegata West.** *(=S. nigra argentei-marginata)*, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **nigra laciniata L.**, Zerschlitztblättriger Holunder, **F:** Am Grabenwald, Bsch. Ecker und Grubbauer.

Santolina L., Heiligenblume — *Compositae.*
— **chamaecyparissus L., H:** Südeuropa, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Schloßberg.
— **viridis Willd.**, *(=S. virens Mill.)*, **H:** Südeuropa, **F:** Am Grabenwald, Schloßberg.

Sarcococca Ldl., Schleimbeere — *Buxaceae.*
— **hookerana humilis Rehd. et Wils., H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

Securinega Juss., Hartholz — *Euphorbiaceae.*
— **suffruticosa Rehd.** *(=S. ramiflora)*, **H:** Nordostasien bis Mittelchina, **F:** Bot. G.

Sibiraea Maxim., Blauspiere — *Rosaceae.*
— **laevigata Maxim., H:** Sibirien, **F:** Bot. G., Schloßberg (Wiednerplatzl).

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Smilax L., Stechwinde — *Liliaceae.*

— **aspera L.**, **H:** Südeuropa bis Indien (Macchien), **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Sophora L., Schnurbaum — *Leguminosae.*

— **japonica L.**, Japanischer Schnurbaum, **H:** China, Korea, **F:** Bot. G., Stadtpark: Ecke Parkstraße—Geidorfplatz, Am Eisernen Tor, Neutorgasse, Radetzkystraße, Oeverseegasse, Lendplatz, Theodor-Körner-Straße, Bsch. Grubbauer (auch *S. japonica pendula)* und Thalhammer.

Sorbaria Ser., Fiederspiere — *Rosaceae.*

— **aitchisonii Hemsl.** *(=S. angustifolia)*, **H:** Afghanistan, Kaschmir, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **arborea C. Schn.**, **H:** Mittel- und Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **sorbifolia A. Br.**, Ebereschen-Fiederspiere *(=Spiraea sorbifolia)*, **H:** Nordasien, **F:** Bot. G.

— **tomentosa Rehd.** *(=Spiraea Lindleyana, Sorbaria Lindleyana)*, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.

Sorbus L., Eberesche — *Rosaceae.*

— **aucuparia L.**, Gemeine Eberesche, Vogelbeerbaum, **H:** Europa bis Westasien und Sibirien, **F:** verbreitet; mit wertvollen Formen, wie

— — **edulis Dieck**, Mährische Eberesche (eßbar!), *(=S. aucuparia moravica)*, **F:** Bot. G., Bsch. Kern und Grubbauer (dort auch *S. aucuparia intermedia, — — pendula, — — prattii).*

— **hybrida L.**, Bastard-Mehlbeerbaum *(=S. aucuparia* x *intermedia)*, **H:** Skandinavien, **F:** Ecke Alberstraße—Lessingstraße.

— **intermedia Pers.**, Schwedischer Mehlbeerbaum, **H:** Nordeuropa, **F:** Leonhardstraße gegenüber Parkhotel, Weingarten oberhalb Schloß St. Martin, Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **prattii Koehne**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **vilmorinii C. Schn.**, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.

Spartium L., Pfriemen — *Leguminosae.*

— **junceum L.**, Binsenpfriemen, **H:** Macchien des Mittelmeergebietes, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Joanneumgarten.

Spiraea L., Spierstrauch — *Rosaceae.*

— **albiflora Zbl.**, Weißer Spierstrauch, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker.

— **arguta Zbl.**, Spitzblättriger Spierstrauch *(=S. multiflora* x *thunbergii)*, **F:** Stadtpark, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— **billiardii Herincq.** *(=S. douglasii* x *salicifolia)*, **F:** Bsch. Ecker.

— **blanda Zbl.**, Niedlicher Spierstrauch *(=S. chinensis* x *cantoniensis)*, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **bullata Maxim.**, Runzeliger Spierstrauch, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **bumalda Burv.** *(=S. albiflora* x *japonica, =S. pumila, =S. japonica* var. *Bumalda)*, Typ nicht in Kultur, meist die **f. „Anthony Waterer"**, **F:** Bot. G. (dort auch *S. bumalda crispa)*, Stadtgärtnerei, Stadtpark, Georgigasse (Grünanlage mit Hecke), Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

— — **pruhoniciana Rehd.** *(=S. japonica ovalifolia* x *„Anthony Waterer")*, **F:** Bsch. Grubbauer.

— **canescens D. Don.**, Weißgrauer Spierstrauch, **H:** Himalaja, **F:** Bot. G.

— **cantoniensis Lour.**, Kanton-Spierstrauch, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

— **chamaedryfolia L.**, Gamander-Spierstrauch *(=S. flexuosa)*, **H:** Südosteuropa bis Nordostasien, **F:** Bot. G., nicht selten als Hecken gezogen.

— — **ulmifolia Maxim.** *(=S. ulmifolia)*, **F:** Bot. G.; nicht selten kultiviert.

— **douglasii Hook.**, Douglas-Spierstrauch, **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Am Grabenwald, Bsch. Ecker.

— **fontenaysii Billiard** *(=S. canescens* x *salicifolia)*, **F:** Bsch. Ecker.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **japonica L. f.**, Japanischer Spierstrauch, **H:** Japan, **F:** Bot. G. (*S. japonica ovalifolia*).
— **latifolia Borkh.**, Breitblättriger Spierstrauch, **H:** Nordostamerika, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **menziesii Hook.**, **H:** Nordwestamerika, **F:** Mühlriegel, Tegetthoffplatz.
— **mollifolia Rehd.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **nipponica Maxim.**, **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **prunifolia plena C. Schn.**, Pflaumenblättriger Spierstrauch, **H:** China, Korea, Formosa, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
— **rubra Zbl.**, Roter Spierstrauch (=*S. fastigiata* x *douglasii*), **F:** Bsch. Grubbauer.
— **salicifolia L.**, Weidenblättriger Spierstrauch, **H:** Südosteuropa bis Nordostasien und Japan, **F:** Bot. G. — Sonst kultiviert.
— **superba Zbl.**, Pracht-Spierstrauch (=*S. albiflora* x *corymbosa*), **F:** Bsch. Ecker.
— **thunbergii Sieb.**, Thunbergs-Spierstrauch, **H:** China, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker, Kern und Thalhammer.
— **trichocarpa Nakai**, **H:** Korea, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **trilobata L.**, Dreilappiger Spierstrauch, **H:** Nordchina bis Turkestan, **F:** Bot. G.
— **vanhouttei Zbl.** (=*S. cantoniensis* x *trilobata*), **F:** Stadtpark, Bsch. Ecker, Grubbauer, Kern und Thalhammer.

Stachyurus S. et Z., Schweifähre — *Stachyuraceae.*
— **chinensis Franch.**, **H:** China, **F:** Bot. G.

Staphylea L., Pimpernuß — *Staphyleaceae.*
— **bolanderi A. Gr.**, **H:** Kalifornien, **F:** Bot. G.
— **pinnata L.**, Gefiederte Pimpernuß, **H:** Europa bis Westasien, **F:** Schloßberg: unterhalb des Starcke-Häuschens, Hilmteich. — In Graz nur kultiviert.
— **trifolia L.**, Dreizählige Pimpernuß, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G.

Stephanandra S. et Z., Kranzspiere — *Rosaceae.*
— **incisa Zbl.**, Fliederspaltige Kranzspiere, **H:** Japan, Korea, **F:** Bot. G., Gärtnerei Penitz in Liebenau, Bsch. Ecker und Grubbauer.
— **tanakae Franch.**, Gelappte Kranzspiere, **H:** Japan, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten, Stadtpark, Bsch. Grubbauer und Thalhammer.

Symphoricarpus Juss., Schneebeere — *Caprifoliaceae.*
— **albus laevigatus Blake**, Gemeine oder Traubige Schneebeere (=*S. racemosus*), **H:** westliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Eckertstraße (Hecke), Schloßpark Eggenberg, Sanatorium Eggenberg u. a. häufig.
— **occidentalis Hook.**, Westliche Schneebeere, **H:** mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **orbiculatus Moench**, Rotfrüchtige oder Rundblättrige Schneebeere, Korallenbeere, **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Stadtgärtnerei, Bsch. Ecker und Grubbauer (in letzterer auch *S. orbiculatus variegatus*).

Syringa L., Flieder — *Oleaceae.*
— **amurensis japonica Fr. et Sav.** (=*S. japonica*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **chinensis Willd.** (=*S. persica* x *vulgaris*, =*S. rothomagensis*), **F:** Schloßpark Eggenberg, Bsch. Ecker.
— **emodi Wall.**, Himalaja-Flieder, **H:** Himalaja, Afghanistan, **F:** Stadtpark, Stadtgärtnerei, Bsch. Grubbauer.
— **josikaea Jacq.**, Ungarischer Flieder, **H:** Ungarn, Galizien, **F:** Bot. G., Ecke Schubertstraße—Hilmteichstraße, Bsch. Grubbauer, Kern und Thalhammer.
— **komarowii C. Schn.**, **H:** Westchina, **F:** Bsch. Grubbauer.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **oblata giraldii Rehd.**, **H:** Nordchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **persica L.**, Persischer Flieder, **H:** Persien bis Nordwestchina, **F:** Bot. G., beim Blumenhaus Panning, in der Nähe des Mozart-Denkmals, u. a.
— **reflexa C. Schn.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **sweginzowii Koehne et Lingelsh.**, **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **vulgaris L.**, Gemeiner Flieder, **H:** Südosteuropa, **F:** häufig in Gärten und Anlagen mit rund 500 bekannten Formen, z. B. „Andenken an L. Späth" im Herbersteingarten mit einfachen, dunkelpurpurnen Blüten.

Tamarix L., Tamariske — *Tamaricaceae.*
— **gallica L.**, Gemeine Tamariske, **H:** Mittelmeergebiet, **F:** Weingartenweg (Eggenberg), Josef-Pock-Straße (Unterfahrt).
— **odessana Stev.**, Russische Tamariske, **H:** Südrußland, **F:** Herbersteingarten, Bsch. Grubbauer und Thalhammer.
— **parviflora DC.**, **H:** Südosteuropa, **F:** Bot. G.
— **tetranda Pall.**, Viermännige Tamariske, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bsch. Grubbauer und Kern, Weichselbaumgasse (Gösting).

Tilia L., Linde — *Tiliaceae.*
— **americana L.**, Schwarz-Linde *(=T. glabra, =T. nigra)*, **H:** östliches Nordamerika, **F:** Bot. G., Stadtpark.
— **cordata Mill.**, Winter- oder Stein-Linde, **H:** Europa bis Kaukasus, **F:** Bot. G., Bsch. Kern u. a.
— **platyphyllos Scop.**, Sommer-Linde, **H:** Europa, **F:** Bot. G., Mariatrosterstraße 194 (Naturschutz!), Bsch. Kern u. a.
— **tomentosa Moench**, Silber-Linde, **H:** Südosteuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark (Anfang der Allee von der Leonhardstraße zur Burg), bei der Weinzödlbrücke.

Ulmus L., Ulme, Rüster — *Ulmaceae.*
— **carpinifolia Gleditsch.**, Feld-Ulme *(=U. campestris p. pte, =U. foliacea, =U. glabra)*, **H:** Europa, Nordafrika, Westasien, **F:** Stadtpark, Schloßberg, Grabenstraße 36 (Naturschutz!). — Verbreitet.
— — **wredei Rehd.**, Goldsäulen-Ulme *(=U. campestris dampieri wredei)*, **F:** Rosenberg: Villa Luschin, Bsch. Grubbauer.
— **glabra Huds.**, Berg-Ulme *(=U. scabra)*, **H:** Nord- und Mitteleuropa, Westasien, **F:** Bot. G., Stadtpark, Schloßberg, Rosenberg: Minoritenschlößl, Bachwirt (Gösting) u. a.
— — **pendula Rehd.**, Hänge- oder Trauer-Ulme, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **laevis Pall.**, Flatter-Ulme *(=U. effusa)*, **H:** Mitteleuropa bis Westasien, **F:** Stadtpark, Schloßberg. — Wildwachsend in den Murauen.
— **parvifolia Jacq.**, **H:** China, Korea, Japan, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Viburnum L., Schneeball, Schlinge — *Caprifoliaceae.*
— **burkwoodii Burkw.** *(=V. carlesii x utile)*, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **carlesii Hemsl.**, **H:** Korea, **F:** Bot. G., Mälzerweg (Rudersdorf), Bsch. Grubbauer.
— **fragrans Bge.**, **H:** Nordchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **opulus L.**, Gemeiner Schneeball, **H:** Europa bis Nordasien, **F:** Bot. G., Bsch. Kern. — Sonst häufig wildwachsend.
— — **roseum L.**, Gefüllter Schneeball *(=V. opulus sterile)*, **F:** Schloßberg: Nähe des alten Senders u. a., Bsch. Ecker, Grubbauer und Thalhammer.
— **plicatum tomentosum Miq.**, Filziger Schneeball *(=V. tomentosum)*, **H:** Japan, China, **F:** Bsch. Ecker.
— **prunifolium L.**, Pflaumenblättriger Schneeball, **H:** östliche und mittlere Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.
— **rhytidophyllum Hemsl.**, **H:** West- und Mittelchina, **F:** Bot. G., Joanneumgarten, Landeskrankenhaus, Bsch. Grubbauer.

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

— **trilobum Marsh.**, Amerikanischer Schneeball (=*V. oxycoccus*, =*V. opuloides*), **H:** nördliche Vereinigte Staaten bis Britisch-Kolumbien, **F:** Bot. G.
— **utile Hemsl.**, **H:** Mittelchina, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Vitex L., Keuschbaum — *Verbenaceae.*
— **agnus-castus L.**, **H:** Südeuropa, Westasien, **F:** Bsch. Klenert.

Vitis L., Rebe — *Vitaceae.*
— **amurensis Rupr.**, Amur-Rebe, **H:** Mandschurei, Amurgebiet, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.
— **coignetiae Pulliat.**, Rostrote Rebe, **H:** Japan, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **vulpina L.**, Ufer-Rebe (=*V. odoratissima*, =*V. cordifolia*, =*V. riparia*), **H:** östliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Bsch. Grubbauer.

Weigela Thunb., Weigelie — *Caprifoliaceae.*
— **floribunda C. A. Mey.**, Reichblütige Weigelie (=*Diervilla floribunda*), **H:** Japan, **F:** Stadtgärtnerei, Bsch. Klenert und Thalhammer.
— — **versicolor Rehd.**, **F:** Bsch. Grubbauer.
— **florida S. et Z.**, Schönblütige Weigelie (=*Diervilla florida*), **H:** Nordchina, Korea, **F:** Bot. G., Bsch. Ecker.
— — **variegata Bailey.**, **F:** Bot. G.
— **hybrida Jaeg.**, meist wiederholte Kreuzungen verschiedener Arten, mit verschiedenen Phantasienamen, z. B. Eva Rathke, Styriaca (Klenert) usw., **F:** Bsch. Kern, Stadtpark u. a.

Wisteria Nutt., (=*Wistaria Spreng*), Glycine, Blauregen, Wistarie — *Leguminosae.*
— **floribunda macrobotrys Rehd. et Wils.**, Vieljochiger Blauregen (=*W. multijuga*), **H:** Japan, **F:** Bot. G.
— **sinensis Sweet**, Chinesischer Blauregen, **H:** China, **F:** Schloßberg: Aufgang Sackstraße, Pergola unter Kanonenbastei, Kriegerdenkmal (f. *alba*), Humboldtstraße u. a., Bsch. Grubbauer (dort auch f. *alba* und *rosea* fl. pl.), Bsch. Kern und Thalhammer.

Xanthoxylon L., Gelbholz — *Rutaceae.*
— **americanum Mill.** (=*X. fraxineum*), **H:** nördliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G.

Yucca L., Palmenlilie — *Liliaceae.*
— **filamentosa L.**, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bot. G., Schloßberg: Herbersteingarten unter der großen Basteimauer, Am Grabenwald, Mälzerweg (Rudersdorf).
— **flaccida Haw.**, **H:** südöstliche Vereinigte Staaten, **F:** Bsch. Ecker.

Zelkova Spach, Zelkowe — *Ulmaceae.*
— **carpinifolia K. Koch**, Kaukasische Zelkowe, **H:** Kaukasus, **F:** Stadtpark: nordwestlich vom Anastasius-Grün-Denkmal.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Franz Hanselmayer, Graz-Eggenberg, Am Grabenwald 14.

Für den Inhalt ist der Verfasser verantwortlich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Abteilung für Zoologie und Botanik am Landesmuseum Joanneum Graz

Jahr/Year: 1956

Band/Volume: H06_1956

Autor(en)/Author(s): Hanselmayer Franz

Artikel/Article: In Graz gepflanzte Laubhölzer 3-30