

genannten Winter innerhalb der Oberförsterei sieben Stück, mehr nicht! Wahr ist allerdings, dass der Uhu in Ibenhorst noch recht häufig ist“.

Aquila chrysaëtus (L.) In dem Ibenhorster Forst hat sich seit der Mitte des Februar ein Exemplar eingefunden. Obgleich der Vogel dauernd beobachtet werden kann, ist es bis jetzt noch nicht gelungen, denselben zu erlegen.

Archibuteo lagopus (Brünn.) In der ganzen Provinz recht häufig beobachtet und geschossen worden.

Pandion haliaëtus (L.) Ein Stück wurde bei Kiauten erlegt.

Circus macrurus (Gm.) Ein bei Sodargen erlegtes Exemplar erhielt Herr Techler am 17. September.

Haematopus ostrilegus L. Sehr selten in unserer Provinz. Am 18. September erhielt Herr Techler ein Stück, welches im Binnenlande bei Seeburg geschossen wurde.

Fuligula hyemalis (L.) In mehreren Stücken an der Ostsee erlegt.

Mergus serrator L. Habe nur von einem Exemplar gehört, welches bei Pillau geschossen wurde.

Eydtkuhnen, im März 1895.

Kleine Notizen.

Kuttengeier in Oesterr.-Schlesien.

Den 19. Mai d. J. wurden bei Tierlitzko, Bez. Teschen, 3 Kuttengeier (*Vultur monachus* L.) beobachtet und ein Stück davon vom Oekonomie-Verwalter Reha erlegt. Letzteres, ein ♂, wird ausgestopft.

Dzingelau, am 26. Mai 1895.

J. Želisko

Aasgeier in S.-Ungarn.

Am 20. Mai d. J. erhielt ich aus Ungar.-Weisskirchen einen ausgefärbten Aasgeier (*Neophron percnopterus* (L.) zum Präparieren. Es waren 3 Stück auf dem Aase.

Budapest, am 21. Mai 1895.

F. Rosonowsky.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologisches Jahrbuch](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Rosonowsky F.

Artikel/Article: [Aasgeier in S.-Ungarn. 245](#)